

Melhorando as condições para o desenvolvimento de culturas agrícolas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Após o tempo seco e quente, uma mudança substancial nas condições agrometeorológicas é esperada durante o próximo período de sete dias. Em meados de julho, são previstas precipitações significativas, uma diminuição das temperaturas e uma melhoria nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas. Haverá probabilidade de granizo.

Após o tempo seco e quente, uma mudança substancial nas condições agrometeorológicas é esperada durante o próximo período de sete dias.

As temperaturas extremamente altas e a baixa umidade atmosférica no início da segunda década de julho tiveram um efeito adverso em parte das culturas de primavera e causaram queda de flores e frutos em algumas culturas hortícolas (tomates, pepinos, abobrinhas, feijão verde). Ao contrário das regiões norte e central, em muitos lugares do sul da Bulgária as precipitações de julho não tiveram significado econômico, o que levou a um aprofundamento do déficit de umidade do solo. Em alguns locais da Planície Trácia (as estações agrometeorológicas de Pazardzhik, Plovdiv, Sliven) não há umidade na camada de solo de 50 cm, e na camada de 100 cm as reservas de umidade do solo são escassas – abaixo de 50–55% da capacidade de campo.

Durante a primeira metade do próximo período de sete dias, são previstas precipitações significativas, uma diminuição das temperaturas e uma melhoria nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas.

Até o final da segunda década, com temperaturas próximas da norma e reservas de umidade do solo melhoradas, continuarão a floração, a fertilização e o enchimento de grãos no girassol. No milho, dependendo de sua precocidade, serão observados diferentes estágios – desde o emborrachamento em híbridos mais tardios até o início do estágio de maturação leitosa em híbridos precoces de milho em alguns lugares das regiões sul do país. No algodão, será observado o início do estágio de floração até o final do período.

Durante o período, a probabilidade de granizo e o risco de debulha natural dos grãos são novamente previstos. Condições mais adequadas para a realização da colheita do trigo ocorrerão no final da segunda década de julho.

Atualmente, os rendimentos médios de trigo obtidos são bons a muito bons, em muitos lugares do país ultrapassando 500 kg/da.