

O besouro da casca do abeto é uma ameaça séria às florestas de pinheiros.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Um número crescente de florestas de pinheiros na Bulgária está sendo afetado pelo besouro-das-pontas-do-pinheiro, que causa um declínio rápido e em larga escala de povoamentos de coníferas. Especialistas do Ministério da Agricultura, Alimentação e Florestas e da Agência Executiva Florestal discutiram medidas urgentes para limitar os ataques desta praga perigosa. Uma das principais razões para a ocorrência em massa do besouro-das-pontas-do-pinheiro são as mudanças climáticas, que levam à seca e tornam as árvores facilmente suscetíveis a vários patógenos e pragas.

No final da semana passada, foi realizada uma reunião por iniciativa do Vice-Ministro da Agricultura, Alimentação e Florestas, Atanas Dobrev, e da administração da Agência Executiva Florestal. Especialistas em

ciência florestal discutiram detalhadamente os danos causados pelo besouro-das-pontas-do-pinheiro e quais medidas urgentes precisam ser tomadas imediatamente.

As medidas incluem acelerar o processo de atribuição da execução de cortes sanitários e obrigatórios, bem como envolver todas as partes interessadas no processo de combate à praga. É extremamente importante que todos os proprietários florestais, incluindo os privados, participem da luta contra esta praga florestal. Para este fim, serão realizados seminários informativos com representantes das autoridades locais, que auxiliarão no processo de identificação e informação dos proprietários florestais privados sobre a limitação da invasão do besouro-das-pontas-do-pinheiro.

O problema afeta principalmente florestas de coníferas estabelecidas artificialmente e é causado principalmente pelo seu florestamento em altitudes mais baixas do que sua área de distribuição natural. A ciência recomenda apenas a execução de cortes sanitários e obrigatórios como solução, e a remoção da madeira seca infectada e danificada.

As árvores danificadas e secas também são uma ameaça potencial para a ocorrência de incêndios, especialmente durante os meses de verão. O corte gradual das áreas florestais afetadas deve ser realizado com cuidado, sem mudanças drásticas no ambiente e sem expor áreas descobertas.

Para controlar o problema, são necessários esforços conjuntos de todas as partes interessadas, bem como a compreensão do público.

Besouro-das-pontas-do-pinheiro (*Ips acuminatus* Gyll.)

Está amplamente distribuído por toda a Europa, Ásia, América do Norte, bem como em nosso país. Ataca principalmente o pinheiro-silvestre – as partes superiores da copa, os galhos mais grossos e o tronco. As galerias maternas e larvais interrompem os tecidos condutores e a árvore morre em um período muito curto de tempo. As agulhas inicialmente murcham e depois adquirem uma cor vermelha característica, razão pela qual as florestas afetadas são conhecidas como florestas vermelhas. A madeira danificada é desvalorizada, as perdas são enormes e os ecossistemas florestais têm suas funções prejudicadas.

Em condições favoráveis, o besouro-das-pontas-do-pinheiro produz duas gerações por ano: abril – maio e julho – agosto. O adulto hiberna e na primavera cria orifícios de saída redondos e ataca árvores vizinhas. As larvas se desenvolvem rapidamente em 20 – 25 dias e em agosto a segunda geração ataca as árvores vizinhas.

As mudanças climáticas são o principal fator por trás do desenvolvimento de uma segunda geração no norte da Bulgária.