

Previsão agrometeorológica semanal para o final de julho e início de agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



Até o final de julho e durante os primeiros dias de agosto, o desenvolvimento das culturas agrícolas ocorrerá sob temperaturas próximas às normas climáticas, e em muitas partes do país – com reservas de umidade do solo melhoradas.

Após as tempestades, granizo e chuvas torrenciais (Ruse - 45 l/m², Silistra - 43 l/m² e Shumen - 33 l/m²) que caíram durante os últimos dias do período passado, espera-se uma estabilização do tempo e uma mudança nas condições agrometeorológicas no período seguinte. O granizo que caiu em muitos locais do Norte da Bulgária (Vratsa, Polski Trambesh, Troyan, Ruse, Tsarev Brod) mais uma vez não poupou as culturas agrícolas.

Foram causados danos a parte dos pés de trigo ainda não colhidos (acamamento das lavouras, espigas desgranadas), bem como a culturas de primavera, culturas hortícolas e árvores frutíferas.

No início do próximo período, na primeira oportunidade, as culturas hortícolas, árvores frutíferas e videiras afetadas pelo granizo devem preferencialmente ser tratadas com fungicidas à base de cobre, a fim de acelerar a cicatrização das feridas e reduzir infecções secundárias por patógenos (mofo cinzento em videiras, podridão parda tardia nos frutos das árvores frutíferas, requeima da batata e *Alternaria* em tomates).

Até o final de julho e durante os primeiros dias de agosto, o desenvolvimento das culturas agrícolas ocorrerá sob temperaturas próximas às normas climáticas, e em muitas partes do país – com reservas de umidade do solo melhoradas. Durante o período, nos híbridos de milho mais precoces, será observado o estágio de maturação leitosa e uma transição da maturação leitosa para a cerosa nas lavouras em locais da Planície Danubiana e nas regiões sul do país. No girassol, ocorrerá o enchimento das sementes. No início de agosto, parte das lavouras no Sul da Bulgária entrará no início da fase de maturação.

Durante o período, o aumento do teor de umidade nas camadas superficiais do solo atrasará, em alguns locais, a conclusão da colheita do trigo.

Fonte: NIMH-BAS