

Proгноza agrometeorologică pentru martie 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 Брой: 3/2019



La începutul lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme caldă pentru sezon. În prima decadă, în majoritatea regiunilor arabile ale țării, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice vor depăși minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor de vegetație la culturile de cereale de toamnă și rapiță.

La începutul celei de-a doua decade, se prognozează o scădere a temperaturilor, mai semnificativă în nordul Bulgariei și pe câmpiile înalte, ceea ce va limita și va întârzia dezvoltarea culturilor agricole. În această decadă, condiții pentru o vegetație lentă la culturile de cereale de toamnă se vor crea în principal în regiunile extreme de sud-est și sud ale țării.

La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade a lunii martie, se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor de temperatură și o activare a proceselor de vegetație la culturile semănate toamna și la plantațiile perene. Până la sfârșitul lunii martie, majoritatea culturilor de grâu și orz cu dezvoltare târzie care au iernat în stadiul de 2-3 frunze vor intra în stadiul de încălțare. La culturile de cereale de toamnă care s-au încălțat toamna, se va observa o creștere a coeficientului de încălțare. La sfârșitul lunii martie, rapița care a iernat în stadiul de rozetă va forma ramuri.

În luna martie, la culturile pomicole vor avea loc fazele de umflare a mugurilor și de deschidere a mugurilor.

La sfârșitul lunii, la speciile cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) se va observa stadiul de mugur de floare, iar în unele locuri, în special în regiunile sudice, și începutul înfloririi. Pe parcursul lunii, temperaturile minime prognozate, până la minus 8°C, vor prezenta un risc pentru pomii fructiferi cei mai avansați care au intrat în fazele de formare a mugurilor și înflorire. Precipitațiile așteptate în martie, în jurul normei, vor spori rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru și în straturile mai adânci. La sfârșitul lunii februarie, în majoritatea regiunilor arabile, rezervele de umiditate a solului pentru culturile de cereale de toamnă în stratul de un metru erau peste 90% din capacitatea de câmp (CC). Excepții s-au înregistrat local în Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Novachene), în regiunile extreme sudice (Haskovo) și estice (D. Chiflik), unde nivelul rezervelor de umiditate era mai mic – 85–86% din CC. Pe parcursul lunii, condiții mai favorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire premergătoare semănatului pe suprafețele destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii și medii-timpurii, precum și pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare în livezi, vor apărea la începutul lunii, în a doua jumătate a celei de-a doua decade și la mijlocul celei de-a treia decade. La mijlocul lunii martie începe fereastra agrotehnică (15–20.03) pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei, iar la mijlocul celei de-a treia decade (25.03–5.04) – în Câmpia Dunării.

Sursa: NIMH