

Proгноză agrometeorologică pentru aprilie 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.04.2019 Брой: 4/2019



La începutul lunii aprilie, un factor limitativ atipic pentru sezon pentru dezvoltarea culturilor de toamnă și a celor de primăvară semănate în majoritatea suprafețelor de câmp va fi deficitul de umiditate din straturile superioare ale solului. Ca urmare a precipitațiilor sub normale din februarie și martie, în multe zone ale țării rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm și 100 cm sunt insuficiente pentru începutul primăverii. Cel mai scăzut nivel al rezervelor de umiditate în stratul de 50 cm pentru culturile cerealiere de toamnă se observă în regiunile sudice și estice, în unele locuri sub 60% din capacitatea de câmp (CC).

În a doua jumătate a primei decade, se prognozează precipitații și se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor pentru vegetația culturilor agricole. În această perioadă, culturile de grâu și orz care s-au încovoiat toamna vor intra în stadiul de înălțare a tulpinii. La rapiță, care a iernat în stadiul de rozetă, vor avea loc ramificarea și formarea

mugurilor. În stadiul de mugurare (de la mugur verde la galben), este atacată de cel mai periculos dăunător – gândacul florilor de rapiță. Dacă este necesar (pragul economic de vătămare >5 gândaci pe plantă), tratamentul cu insecticide la rapiță se efectuează înaintea stadiului de înflorire.

În a doua și a treia decadă, condițiile agrometeorologice vor fi foarte dinamice. Dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm moderat, la temperaturi apropiate de normele climatice. Precipitațiile așteptate, în jurul și sub normă, vor îmbunătăți rezervele de umiditate în principal în stratul de 50 cm. Acestea vor avea o importanță majoră pentru culturile cerealiere de toamnă, care se vor afla predominant în stadiul de înălțare a tulpinii. În acest stadiu, cerințele plantelor pentru umiditatea solului cresc brusc. La sfârșitul lunii aprilie, cele mai timpurii culturi de grâu înălțate, care au atins acest stadiu la sfârșitul lui martie, vor intra în stadiul de înspicere. Perioada dintre înălțarea tulpinii și înspicere este critică pentru infectarea grâului cu făinarea și rugină brună. În această perioadă, este necesară și monitorizarea apariției și activității dăunătoare a ploșniței cerealelor, a gândacului frunzelor de cereale și a tripsului grâului.

În a doua jumătate a lunii aprilie, rapița se va afla predominant în stadiul de înflorire. La floarea-soarelui și porumb, în funcție de datele de semănat, se vor observa stadiile de răsărire și formare a frunzelor.

Până la sfârșitul celei de-a doua decade, nu poate fi exclusă posibilitatea formării înghețurilor, ceea ce trebuie luat în considerare la întărirea răsadurilor de legume și tutun.

În a doua decadă, temperaturile solului la adâncimea de 10 cm în regiunile de câmpie vor atinge valori potrivite pentru semănatul porumbului pentru boabe, iar până la sfârșitul celei de-a treia decade – și pentru culturile de primăvară termofile (bumbac, fasole, arahide, pepeni, pepeni galbeni).

Vremea variabilă așteptată pe parcursul lunii, cu ploi frecvente, va crea condiții pentru dezvoltarea unor boli fungice la culturile pomicole (arsura florilor/putregaiul brun timpuriu, gălbejugul piersicului, gaura de glonț, tăciunele la măr și păr, căderea fructelor la gutui, etc.). Condiții potrivite pentru efectuarea pulverizărilor de protecție a plantelor în livezi vor apărea la începutul lunii aprilie, precum și la începutul și sfârșitul celei de-a doua și a treia decade.