

Vremea umedă din prima jumătate a lunii mai este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea patogenilor fungici.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Vremea umedă va crea condiții pentru apariția și dezvoltarea patogenilor fungici, prevenția cărora necesită aplicarea de fungicide sistemic.

În perioada 3–9 mai, sunt prevăzute condiții agrometeorologice dinamice și variabile. Procesele de vegetație la culturile agricole vor decurge la temperaturi medii sub normele climatice și cu precipitații frecvente, conform prognozei sinoptice.

În prima jumătate a perioadei se așteaptă precipitații, în multe locuri din zonele de câmpie ale țării chiar intense, care vor menține rezervele de umiditate a solului îmbunătățite după seceta timpurie de primăvară depășită.

Vremea vântoasă așteptată va limita suplimentar posibilitățile de desfășurare a activităților de protecție a plantelor în culturile de cereale de toamnă, rapiță și în plantațiile pomicole permanente.

Pe parcursul perioadei, grâul se va afla în fazele de înălțare a tulpinii, trecere de la înălțarea tulpinii la înspic și înspicare. La rapiță se va observa înflorirea, formarea și creșterea păstăilor. La culturile de primăvară semănate va avea loc formarea frunzelor.

Vremea umedă va crea condiții pentru apariția și dezvoltarea patogenilor fungici, prevenția cărora necesită aplicarea de fungicide sistemic.

La sfârșitul perioadei, se prognozează o îmbunătățire a condițiilor agrometeorologice (o începere a creșterii temperaturilor, slăbirea vântului, probabilitate scăzută de precipitații) și crearea unor oportunități mai favorabile pentru desfășurarea activităților agrotehnice.

Sursa: INMH