

Proгноza agrometeorologică pentru luna iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 Брой: 6/2019



În majoritatea zilelor din iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă cu precipitații distribuite neuniform, ceea ce va duce, de asemenea, la diferențe substanțiale în nivelurile rezervei de umiditate a solului. În Bulgaria de Vest, unde se preconizează că precipitațiile din iunie, similar cu cele din mai, vor atinge și depăși normele lunare, se prognozează rezerve foarte bune de umiditate a solului. Pentru culturile de primăvară, în stratul de 50 și 100 cm acestea vor rămâne peste 80% din capacitatea de câmp (CC). Niveluri mai scăzute ale rezervelor de umiditate a solului sunt așteptate în regiunile estice, unde se prognozează și mai puține precipitații în iunie.

În primele două decade, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm moderat, sub temperaturi apropiate de normele climatice. La începutul lunii iunie, în câmpiile mai înalte, va avea loc umplerea boabelor la

culturile de cereale de toamnă. La grâul din zonele de câmpie, se va observa stadiul de coacere lăptoasă, în timp ce la orz – coacere lăptoasă și trecere la coacere cerată. La grâu, în perioada interfață de umplere a boabelor – coacere lăptoasă, larvele ploșniței cerealelor (*Eurygaster integriceps*) provoacă pagube serioase. În această perioadă, mustrele de grâu trebuie inspectate pentru prezența dăunătorului și, la densități care depășesc pragul economic de dăunare (2 larve/m²), tratamentul insecticid este imperativ.

La sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade, orzul va fi predominant în coacere cerată, iar rapița va fi în stadiul de coacere.

În a treia decadă, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm accelerat, sub condiții termice peste normă. În prima jumătate a acestei decade, grâul din zonele de câmpie va atinge coacerea cerată și deplină. Până la sfârșitul lunii iunie, unele dintre culturile de primăvară vor intra în stadii de dezvoltare reproductivă – la floarea-soarelui va începe înflorirea, iar la hibridii timpurii de porumb – înmugurirea și înflorirea inflorescenței masculine.

Pe parcursul lunii, temperaturile maxime prognozate, local până la 35°C, vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole. Condițiile meteorologice din iunie vor menține un fundal infecțios ridicat al patogenilor fungici: putregaiul brun târziu la soiurile târzii de cireș, pojarul și făinarea la pomii fructiferi, manelele la viță de vie și culturile legumicole. La vița de vie, perioada interfață de la înflorirea inflorescențelor până la formarea boabelor de mărimea unui bob de mazăre este critică pentru infecția cu mană. În prima decadă a lunii iunie, se prognozează o probabilitate crescută de grindină, cu risc de culcare a culturilor și pagube suplimentare culturilor agricole. După o furtună cu grindină, culturile fructifere și legumicole afectate trebuie tratate cu fungicide cuprifere la prima ocazie.

Pe parcursul lunii, condiții mai potrivite pentru efectuarea lucrărilor de prelucrare a solului în vegetație pentru culturile de primăvară vor apărea în a treia decadă.

Sursa: INMH