

Vreme instabilă și temperaturi peste normal

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019



În majoritatea zilelor perioadei de șapte zile (21–27.06.2019), condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi peste normal. La începutul verii, temperaturile maxime extrem de ridicate prognozate, local până la 37–38°C, vor împiedica vegetația culturilor de primăvară. Aceste valori vor avea un impact negativ asupra formării organelor de reproducere ale unor culturi legumicole (fasole verde, roșii, ardei, castraveți etc.), iar în condiții de umiditate atmosferică scăzută pot provoca căderea florilor și a fructelor nou formate. Pentru mijlocul perioadei se prognozează o scădere a temperaturilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole.

În cursul perioadei, la grâu în zonele de câmpie se va observa faza de coacere moale masivă și coacere deplină, iar în ogoarele mai înalte – coacere lăptoasă și trecerea la coacere moale. La floarea-soarelui va avea

loc formarea inflorescenței, iar local în Câmpia Dunării (stațiile agrometeorologice Băzovec, Pavlikeni) se va observa și începutul înfloririi în culturi. La porumb va avea loc formarea frunzelor. Spre sfârșitul perioadei, la hibridii timpurii se va observa începutul înmuguririi. Până la înmugurire, culturile de porumb trebuie inspectate pentru prezența unuia dintre cei mai importanți dăunători economic – molia porumbului (*Ostrinia nubilalis*). Când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunare (10 ponte la 100 de plante), este necesar un tratament insecticid oportun (împotriva larvelor tinere, înainte ca acestea să pătrundă în tulpini).

Precipitațiile din perioadă, în multe zone ale țării, cu excepția regiunilor din sud-est și a litoralului Mării Negre, vor împiedica temporar recoltarea orzului și a grâului. Se prognozează din nou o probabilitate crescută de grindină, cu risc de culcare a culturilor și de vărsare a boabelor. După grindină, se recomandă ca culturile legumicole și viile afectate să fie tratate la prima ocazie cu fungicide care conțin cupru.

Sursa: INMH