

Proгноza agrometeorologică pentru luna august

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



În majoritatea zilelor primei decadă a lunii august, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi în jurul și ușor sub norma pentru perioadă. Condițiile meteorologice prognozate la începutul lunii vor crește nivelul infecțiilor cu anumiți patogeni fungici: măciulii pe culturile legumicole din producția de câmp târzie, putregaiul brun târziu în livezi și putregaiul cenușiu pe soiurile timpurii de struguri care se coc.

Precipitațiile de la sfârșitul lunii iulie, care local în regiunile nord-vestice și centrale au depășit 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vrața, Montana, Loveci, V. Târnovo), și precipitațiile așteptate în prima decadă a lunii august, vor avea un efect benefic asupra culturilor secundare și asupra hibridilor mai târzii de porumb, la care va avea loc formarea și umplerea boabelor. În decursul decadei, hibridii de porumb mijlociu-timpurii vor fi în faza de

maturitate lăptoasă, iar hibrizii timpurii vor atinge maturitatea cerată și completă (stațiile agrometeorologice Bazovets, Kneja, Glavința, Pazardjik, Plovdiv). La floarea-soarelui, în Câmpia Dunării și în regiunile sudice, va avea loc faza de coacere.

La sfârșitul primei decade, se prognozează o creștere substanțială a temperaturilor și o evoluție accelerată a fazelor finale de dezvoltare ale culturilor de câmp târzii. În decursul decadelor a doua și a treia, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme relativ uscată și temperaturi în jurul și peste normele climatice.

În a doua jumătate a lunii august, o mare parte din culturile de câmp târzii își vor finaliza dezvoltarea. La floarea-soarelui se va observa maturitatea tehnică de masă, iar la soia – faza de coacere. La sfârșitul lunii, în hibrizii de porumb mijlociu-târzii va predomina maturitatea cerată. La orez va avea loc faza de maturitate lăptoasă, iar la bumbac – deschiderea păstăilor.

În a doua jumătate a lunii, deficitul de umiditate a solului la culturile secundare se va adânci și va impune creșterea normelor de irigare. În multe locuri din regiunile de câmp, lipsa umidității din straturile superioare ale solului va împiedica efectuarea de calitate a arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului rapiței de toamnă. Termenele agrotehnice de semănat pentru rapiță încep în a treia decadă a lunii august.

În luna august, pentru soiurile târzii de pomi fructiferi, nu trebuie subestimată activitatea dăunătoare a ultimei generații de molii ale fructelor. Vremea relativ uscată din majoritatea zilelor lunii va fi o premisă pentru creșterea populațiilor de acarieni. În plantațiile viticole, este necesar să se monitorizeze apariția și densitatea larvelor generației a treia a moliei strugurilor. Tratamentele de protecție a plantelor trebuie efectuate în orele mai răcoroase ale zilei cu produse care au un interval de așteptare corespunzător, în concordanță cu perioada de coacere a culturilor.

Sursa: INMH