

Proгноza agrometeorologică pentru septembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 Брой: 9/2019



La începutul lunii septembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme uscată, caldă și, în multe locuri din zonele de câmpie, caniculară, ceea ce va accelera progresul etapelor finale de dezvoltare ale culturilor de câmp tardive. În prima săptămână a lunii, hibrizii de porumb semi-târzii vor atinge maturitatea cerosă și deplină, în timp ce hibrizii târzii vor fi în faza de lapte și trecerea la maturitatea cerosă.

În majoritatea zilelor primei decade, condițiile vor rămâne favorabile pentru efectuarea recoltării floarea-soarelui și pentru eliberarea suprafețelor semănate cu hibridi mai timpurii de porumb. Spre sfârșitul decadei, se prognozează o scădere a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Precipitațiile așteptate, după seceta intensificată de la sfârșitul verii, vor îmbunătăți starea stratului superior al solului, ceea ce este o

premisă pentru o pregătire pre-semănată și o semănată de mai bună calitate a rapiței de toamnă. Perioadele agrotehnice optime pentru semănatul rapiței se încheie până la sfârșitul celei de-a doua decade din septembrie.

În decada a doua și a treia, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de normele climatice. Până la mijlocul lunii septembrie, hibrizii târzii de porumb își vor încheia dezvoltarea; orezul va fi în maturitate cerosă și deplină, iar sfecla de zahăr va atinge maturitatea tehnică. În decada a treia, mai devreme decât datele obișnuite, soiurile târzii de viță de vie vor atinge maturitatea tehnologică. Bumbacul va fi în faza de coacere.

Precipitațiile prognozate în a doua jumătate a decadei a doua și la începutul decadei a treia vor fi de o importanță majoră pentru încolțirea normală a rapiței. În regiunile unde umiditatea nu este un factor limitativ, în culturile semănate în perioada agrotehnică, faza de încolțire va fi observată la sfârșitul lunii septembrie. În faza de încolțire, pagube grave rapiței sunt cauzate de puricele negru al verzei (adult) și de musca frunzelor de rapiță (false omizi), ceea ce impune monitorizarea în această etapă pentru a determina apariția și densitatea populației dăunătorilor. Când densitatea depășește pragul economic de dăunare (PED pentru puricele negru al verzei - 2 gândaci pe m²; PED pentru musca frunzelor de rapiță 2-3 false omizi pe m²), tratamentul este obligatoriu.

În septembrie, pentru culturile legumicole din producția de câmp tardivă, tratamentele de protecție a plantelor împotriva omizilor generației a treia a viermelui capsiei nu trebuie subestimate, deoarece acestea provoacă daune și deteriorează calitatea recoltei legumicole.

În decada a treia a lunii, în câmpiile mai înalte nu poate fi exclusă posibilitatea formării înghețurilor, ceea ce trebuie luat în considerare la recoltarea culturilor legumicole sensibile la îngheț (roșii, ardei).

Sursa: INMH