

Activități de protecție a plantelor de toamnă în livadă

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



În septembrie, seceta de vară-toamnă continuă. Aceasta se simte mai distinct în regiunile estice, unde precipitațiile medii lunare se ridică la 25-30 l/mp. În partea vestică a țării nu depășesc 40-50 l/mp.

În anumite ani, precipitațiile medii lunare ajung între 5 și 10 l/mp. Temperatura medie zilnică este de la 15 la 20 °C, iar după 20 septembrie scade cu aproape 2-3 °C. Cea mai ridicată temperatură zilnică atinge 28-32 °C, iar cea mai scăzută temperatură medie este între 3 și 8 °C.

În aceste condiții climatice, mediul este favorabil apariției și înmulțirii insectelor și acarienilor polivoltini. Acestea își dezvoltă ultimele generații, iar densitatea acestor populații va determina în mare măsură nivelul daunelor din

anul următor. Pe parcursul lunii, se creează condiții pentru formarea rouăi abundente, care este o cauză a infecțiilor de tăciune la măr și păr, fitoftora la roșiile târzii și altele.

Mere și pere

La începutul lunii, trebuie monitorizat zborul moliei merelor (sfârșitul celei de-a doua generații și parțial a treia) și efectuate tratamente acolo unde este necesar.

După o inspecție amănunțită și depistarea infecțiilor tardive de tăciune, precum și pentru combaterea bolilor care se dezvoltă în timpul depozitării produselor, se efectuează tratamente cu Topsin M 70 WG - 0,1% sau Top plus 70 WP - 0,1%. Pentru o bună păstrare a merelor și perelor și pentru reducerea putregaiurilor și alterărilor în timpul depozitării, este de asemenea indicat să se efectueze un tratament post-recoltă cu Topsin M 70 WG - 0,120%. După pulverizare, fructele sunt lăsate să se usuce și apoi așezate în camere frigorifice sau în pivnițe adânci și răcoroase.

Vii

În această perioadă, mușgaiul cenușiu provoacă daune semnificative viței de vie de la începutul colorării boabelor până la consum. Prin urmare, în vreme umedă și rece din septembrie, se efectuează tratamente cu Topsin M 70 WG - 0,2%. În acest timp, adulții celei de-a treia generații a moliei strugurilor sunt de asemenea în zbor. Omizile afectează boabele de struguri care se coc sau sunt deja coapte. Pentru combaterea dăunătorului, în soluția de pulverizare fungică se adaugă un piretroid autorizat.

Vița de vie tânără de un an este acoperită cu pământ la 3-5 cm deasupra punctului de altoire. Această operațiune se efectuează la sfârșitul lunii septembrie.

În conformitate cu Legea protecției plantelor, agricultorii sunt obligați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor autorizate pentru cultura și dăunătorul respectiv, și la doza corespunzătoare.

Produsele de protecție a plantelor autorizate pentru comercializare sunt publicate pe site-ul Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentelor la adresa electronică: <http://www.babh.government.bg/> sau în „Lista produselor de protecție a plantelor autorizate pentru punere pe piață și utilizare” 2019.

Produsele de protecție a plantelor trebuie achiziționate numai de la companii comerciale care dețin o autorizație!

Atenție! Când lucrați cu produse de protecție a plantelor, trebuie respectate toate cerințele de securitate și sănătate în muncă, de protecție a coloniilor de albine împotriva otrăvirii și de protecție a mediului împotriva poluării!