

Prognoză agrometeorologică pentru octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 Брой: 10/2019



În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatologice și de precipitații apropiate de mediile lunare.

La începutul lunii octombrie, temperaturile prognozate peste normal, cu valori maxime de până la 29-30°C, vor accelera coacerea soiurilor târzii de pomi fructiferi și viță de vie și vor fi o premisă pentru formarea unei producții suplimentare la culturile legumicole târzii.

După vremea nefiresc de caldă din a doua jumătate a primei decadă, se așteaptă o normalizare a condițiilor termice. Precipitațiile de la sfârșitul lui septembrie și ploile așteptate în primele zece zile ale lui octombrie vor asigura umiditatea necesară pentru încolțirea culturilor semănate la începutul toamnei. Seceta de la sfârșitul

verii în multe zone ale țării a întârziat lucrările pregătitoare de semănat ale suprafețelor destinate culturilor de toamnă. Din acest motiv, într-o mare parte a regiunilor de câmp, termenele agrotehnice pentru semănatul rapiței de toamnă au fost depășite. Octombrie este perioada optimă pentru semănatul cerealelor de toamnă. În prima decadă este perioada agrotehnică pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei, din 15 până în 25 octombrie în sudul Bulgariei, iar la sfârșitul lunii – de-a lungul litoralului Mării Negre.

În majoritatea zilelor din a doua și a treia decadă, dezvoltarea suprafețelor semănite cu rapiță și cereale de toamnă va decurge într-un ritm moderat, în condiții termice apropiate de normă. Precipitațiile prognozate în a doua jumătate a lunii octombrie se așteaptă să îmbunătățească nivelul rezervelor de umiditate din sol în stratul de 50 cm și condițiile pentru desfășurarea fazelor inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă. La sfârșitul lunii, la grâu, în funcție de termenele de semănat, se vor observa următoarele faze: încolțire, a treia frunză și începutul înfrățirii, în principal la suprafețele semănite la începutul lui octombrie. La rapiță, va fi în curs formarea frunzelor. La sfârșitul lui octombrie, la cele mai timpurii suprafețe semănite cu rapiță, semănite în septembrie, se va observa începutul fazei de formare a rozetei.

În octombrie, culturile de toamnă sunt atacate de o serie de dăunători. La cerealelor de toamnă, trebuie monitorizată activitatea dăunătoare a șoarecelui de câmp comun, a gândacului frunzelor de grâu și a muștelor cerealelor, iar atunci când densitatea dăunătorilor depășește pragul economic de dăunare (PED), trebuie efectuat un tratament oportun. Pentru șoarecele de câmp comun, PED este de 2 colonii active pe decar; pentru gândacul frunzelor de grâu – 3 larve/mp.

La rapiță, în cursul lunii trebuie efectuate anchete privind apariția puriceului căpșunii (adulti) și a muscării napului (false omizi), iar atunci când numărul acestora depășește PED, trebuie efectuată pulverizarea cu insecticid.

Sursa: INMH