

Prognoză agrometeorologică pentru sfârșitul lunii octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 Брой: 10/2019



În majoritatea zilelor perioadei următoare, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme uscată și caldă pentru sezon, ceea ce va duce la adâncirea deficitului de umiditate în culturile de toamnă. În cele mai multe zone ale țării, în special în unele locuri din nord-vestul Bulgariei – stațiile agrometeorologice Kneja și Băzovec, în Câmpia Sofia – stația agrometeorologică Lozen, și în Câmpia Traciei Superioare – stațiile agrometeorologice Plovdiv, Pazardjik și Sliven, rezervele de umiditate din sol în stratul de 50 cm sunt reduse, sub 45–50% din capacitatea de câmp, iar în unele locuri complet epuizate. În aceste zone, deficitul de umiditate va limita și va întârzia dezvoltarea grâului, orzului și rapiței de toamnă.

Precipitațiile prognozate la sfârșitul perioadei nu vor avea semnificație economică. În unele locuri din Câmpia Dunării există un risc real de desiccare a unei părți din culturile de cereale de toamnă care au germinat.

Pe fundalul secetei intensificate există excepții în regiunile extreme sudice și sud-estice, unde în primele zece zile ale lunii octombrie au căzut cantități mai mari de precipitații – peste 25–30 l/m² – Sandanski, Kardjali, Haskovo, Elhovo și Burgas. Acestea au îmbunătățit condițiile pentru semănat și pentru desfășurarea stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate.

În perioada următoare, în regiunile unde umiditatea nu este un factor limitativ, se va observa încolțirea și începutul formării frunzelor la grâu și orz. O parte din culturile din regiunile sudice, în principal cele semănate la începutul lunii octombrie, vor intra în stadiul celei de-a treia frunze – stația agrometeorologică Karnobat.

În ultima săptămână a lunii octombrie, condițiile vor fi favorabile pentru curățarea suprafețelor de culturile târzii pe rânduri și pentru recoltarea producției de la soiurile de toamnă-iarnă ale pomilor fructiferi. Perioada este potrivită pentru plantarea zmeurului și coacăzului negru.

Sursa NIMH