

Proгноza agrometeorologică pentru sfârșitul anului

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.12.2019 Брой: 12/2019



Vremea neobișnuit de caldă pentru perioada din a doua decadă a lunii decembrie, cu temperaturi maxime ce au depășit 16-17°C în multe locuri din zonele de câmpie, a condus la reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă. Temperaturile peste normal din decembrie au avut un efect benefic asupra culturilor de grâu întârziate, unele dintre acestea atingând suma de temperaturi necesară pentru a intra în faza de trei frunze. În unele localități din nord-estul Bulgariei, unde s-au înregistrat temperaturi de aproximativ 19-20°C (Razgrad, Dobrich, Varna), a crescut și ponderea culturilor de grâu aflate în faza de încovoire. Ca urmare a temperaturilor ridicate din regiunile sudice, la unele specii de arbuști și arbori cu înflorire timpurie (corn, cireș) s-a indus o umflare nedorită a mugurilor.

La începutul celei de-a treia decade a lunii decembrie, temperaturile au fost din nou peste normal, iar valorile medii zilnice în majoritatea zonelor de câmpie au fost peste minimul biologic necesar pentru apariția unei vegetații întârziate la culturile de cereale de toamnă.

După vremea neobișnuit de caldă din mijlocul celei de-a treia decade a lunii decembrie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. Răcirea așteptată spre sfârșitul perioadei va duce la slăbirea și încetarea proceselor vegetative la culturile semănate toamna și va preveni o dezvoltare prematură și nedorită la unele plantații perene, ceea ce ar duce la reducerea rezistenței lor la ger.

În zonele de câmpie, condițiile vor permite efectuarea lucrărilor de pregătire a solului. Precipitațiile prognozate în cursul celei de-a treia decade a lunii decembrie vor crește nivelul rezervelor de umiditate din sol în stratul de 50 cm. La sfârșitul toamnei, în unele localități din regiunile sudice – stațiile agrometeorologice Kyustendil, Chirpan și Sliven – rezervele de umiditate a solului pentru grâu în stratul de 100 cm sunt nesatisfăcătoare, sub 60% din capacitatea de câmp.

Sursa: NIMH