

Întâmpinăm ianuarie cu temperaturi minime foarte scăzute

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Temperaturile minime prognozate în cursul lunii, până la minus 15°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă care nu au reușit să intre în faza de încolțire în timpul vegetației de toamnă. Aceste valori vor fi critice și pentru culturile subdezvoltate de rapiță de toamnă care, ca urmare a secetei toamnei, nu au format o rozetă (de 7–8 frunze) – stadiul în care plantele iernează cu succes.

Temperaturile ridicate din decembrie au prelungit vegetația culturilor semănate toamna. Ca urmare a temperaturilor peste normă, o parte din culturile de cereale de toamnă cu emergență târzie din vestul Bulgariei, la stațiile agrometeorologice Kneja, Sofia, Kyustendil, au format 2–3 frunze.

În ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatice, ceea ce va menține culturile semănate toamna și plantațiile perene în stare de repaus. Cerealele de toamnă vor intra în cea mai rece lună a anului în diferite stadii fenologice – o consecință a secetei prelungite de toamnă și a semănatului întârziat. O parte semnificativă a culturilor va ierna în stadiul de trei frunze. În stadiul de încolțire, stadiul adecvat pentru iernare, se află o mare parte din culturile de grâu din estul Bulgariei, Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol, Karnobat. Slăbite, în stadiile de emergență și formare inițială a frunzelor, se află o parte din culturile de cereale de toamnă semănate târziu (semănate în noiembrie) în unele locuri din Câmpia Dunării, la stațiile agrometeorologice Nikolaevo, Pavlikeni.

Temperaturile minime prognozate în cursul lunii, până la minus 15°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă care nu au reușit să intre în faza de încolțire în timpul vegetației de toamnă. Aceste valori vor fi critice și pentru culturile subdezvoltate de rapiță de toamnă care, ca urmare a secetei toamnei, nu au format o rozetă (de 7–8 frunze) – stadiul în care plantele iernează cu succes.

Precipitațiile așteptate în ianuarie, în jurul și sub normă, vor spori rezervele de umiditate din sol din straturile de 50 cm și 100 cm. La începutul iernii, în majoritatea ținuturilor țării, nivelul rezervelor de umiditate din stratul de un metru de sol este neobișnuit de scăzut pentru acest sezon. În unele locuri din vestul Bulgariei, la stațiile agrometeorologice Kneja, Kyustendil, și în unele regiuni estice, la stațiile agrometeorologice Razgrad, Sliven, acesta este sub 65% din capacitatea de câmp (CC).

În ianuarie, condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierilor de iarnă în livezi și vii vor apărea în a doua jumătate a lunii.

Sursa: INMH