

Prognoză agrometeorologică pentru mijlocul lunii ianuarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



Vremea relativ uscată prognozată pentru perioadă va fi favorabilă pentru efectuarea arăturilor adânci și a lucrărilor inter-rând la viile și livezile, care distrug o mare parte din stadiile de iernare a numeroși dăunători (gărgărițe, molii, muscoi de fructe etc.). Temperaturile pozitive prognozate pe timp de zi vor permite efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de iarnă în livezi.

La începutul lunii ianuarie, în unele localități din vestul Bulgariei (Vidin, Kneja, Dragoman, Sofia, Kiustendil) și din Câmpia Traciei (Plovdiv, Șirpan), s-au înregistrat temperaturi minime de aproximativ minus 10-11°C. Aceste valori, în condiții fără strat de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, sunt periculoase pentru culturile de toamnă semănate târziu, care iernează în fazele de încolțire și dezvoltare inițială a frunzelor.

După scurtul val de frig, în perioada următoare condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Sunt prognozate temperaturi peste normal până la mijlocul lunii ianuarie, însă valorile lor medii zilnice vor rămâne sub minimul biologic necesar reluării proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă, iar plantele vor rămâne într-o stare de repaus.

Nu sunt prognozate precipitații semnificative în cursul perioadei, iar nivelul rezervelor de umiditate din sol la culturile de cereale de toamnă, în straturile de 50 și 100 cm, va rămâne neobișnuit de scăzut pentru acest sezon – în unele regiuni estice sub 60% din capacitatea de câmp. La începutul iernii, în anii fără secetă de toamnă, rezervele de umiditate din sol în stratul de 100 cm ating de obicei niveluri apropiate de capacitatea de câmp.

Vremea relativ uscată prognozată pentru perioadă va fi favorabilă pentru efectuarea arăturilor adânci și a lucrărilor inter-rând la viile și livezile, care distrug o mare parte din stadiile de iernare a numeroși dăunători (gărgărițe, molii, muscoi de fructe etc.). Temperaturile pozitive prognozate pe timp de zi vor permite efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de iarnă în livezi.

Sursa: INMH