

Proгноza agrometeorologică pentru sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.02.2020 Брой: 2/2020



În cursul perioadei, ca urmare a temperaturilor peste normal, culturile de toamnă din suprafețele de câmp vor trece de la o stare de repaus profund la una relativă. În unele zone din Câmpia Dunării și în regiunile estice, unde se prognozează temperaturi maxime de până la 14-15°C, temperaturile medii zilnice vor atinge și vor depăși minimul biologic necesar reluării proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă. Aceste temperaturi peste normal vor afecta în primul rând culturile întârziate aflate în fazele de încolțire și 1-2 frunze. O parte semnificativă a grâului și-a încetat vegetația de toamnă în fazele de a treia frunză și încălț.

Precipitațiile așteptate în perioada următoare nu vor avea semnificație economică, iar rezervele de umiditate din sol pentru culturile de toamnă din suprafețele de câmp vor rămâne neobișnuit de scăzute pentru acest sezon.

La sfârșitul celei de-a doua decadă a lunii ianuarie, în unele regiuni estice (Razgrad, Sliven) nivelul rezervelor de umiditate din straturile de 50 și 100 cm era sub 60% din capacitatea de câmp.

La începutul lunii februarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme caldă pentru sezon. Până la mijlocul primei decade a lunii februarie, se prognozează temperaturi maxime de aproximativ 18-20°C în multe zone ale țării, iar temperaturile medii zilnice vor fi cu 4-5°C peste minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă. În aceste condiții de temperaturi ridicate, neobișnuite pentru sezon, în cea mai mare parte a suprafețelor de câmp, factorul limitativ pentru reluarea proceselor vegetative la culturile semănate toamna va fi deficitul de umiditate din straturile superioare ale solului, ca urmare a precipitațiilor sărace din ianuarie, care, cu puține excepții, sunt sub 10 l/m². Datorită lipsei de umiditate, în unele suprafețe de câmp se observă o gălbire parțială a culturilor de grâu.

La sfârșitul săptămânii curente, se așteaptă o schimbare semnificativă a condițiilor agrometeorologice. Scăderea bruscă prognozată a temperaturilor va împiedica umflarea prematură a mugurilor la unele pomi fructiferi cu înflorire timpurie. Se așteaptă precipitații sub formă de ploaie și zăpadă, precum și o îmbunătățire a condițiilor pentru iernarea culturilor agricole.

În majoritatea zilelor perioadei, condițiile vor permite efectuarea tăierilor în livezi și vii. La culturile pomicole, alături de tăierea de subțiere și scurtare, se efectuează și tăierea fitosanitară – se distrug ramurile și lăstarii mumificați, uscați și atacați de boli. La efectuarea tăierii fitosanitare, tăieturile trebuie făcute la o distanță de 30-40 cm de zona afectată, iar sculele trebuie dezinfectate după fiecare tăietură.

Sursa: INMH