

Vreme dinamică cu precipitații frecvente în martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



Temperaturile sezoniere peste normă din a doua jumătate a lunii februarie au reluat vegetația unei părți însemnate a culturilor agricole pesteiernate.

În prima decadă a lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi din nou determinate de temperaturi peste normal. Vremea caldă prognozată la începutul lunii, cu temperaturi maxime de până la 18-19°C, va activa procesele vegetative la culturile semănate toamna și la pomii fructiferi din regiunile de câmpie ale țării.

Precipitațiile așteptate pe parcursul decadei vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului în stratul de cincizeci de centimetri și condițiile pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă și a rapiței de toamnă. În această

periodă, o parte semnificativă a suprafețelor de grâu, care au pesteiarnat în faza a treia frunză, vor intra în faza de încălțare. La rapiță, va predomina faza de rozetă.

În a doua decadă, temperaturile prognozate, în jurul și ușor sub normele climatice, vor limita dezvoltarea culturilor agricole. În unele locuri din nordul Bulgariei și din regiunile vestice, unde nu se exclud precipitații sub formă de zăpadă, se va observa o slăbire și o încetare de scurtă durată a vegetației la culturile semănate toamna. În restul regiunilor țării, valorile temperaturilor medii zilnice vor fi apropiate de minimul biologic necesar pentru dezvoltarea cerealelor de toamnă și a rapiței de toamnă.

În a treia decadă a lunii martie, se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor termice și o activare a proceselor vegetative la culturile semănate toamna. Spre sfârșitul lunii, în grâu va predomina faza de încălțare. La culturile de cereale de toamnă semănate în perioada agrotehnică optimă, se va observa o creștere a coeficientului de încălțare.

În luna martie, la culturile pomicole vor avea loc următoarele faze fenologice: umflarea și spărgerea mugurilor fructiferi, iar la sfârșitul celei de-a treia decade, la speciile cu sâmbure (migdal, cais, piersic) din regiunile de câmpie, se va observa formarea mugurilor și înflorirea. Temperaturile minime prognozate pe parcursul lunii, până la minus 8°C, vor prezenta un risc pentru culturile pomicole care sunt avansate în dezvoltare și au intrat în fazele de formare a mugurilor și înflorire.

Precipitațiile din februarie, după seceta îndelungată de iarnă, au contribuit la depășirea deficitului de umiditate la cerealele de toamnă din straturile superioare ale solului. Precipitațiile așteptate în martie, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru.

În majoritatea zilelor din martie, vremea dinamică prognozată, cu precipitații frecvente, va îngreuna realizarea unor activități agrotehnice sezoniere. Condiții mai favorabile pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare pre-inflorire în livezi, și pentru pregătirea solului în vederea semănatului pe suprafețele destinate culturilor de primăvară timpurii și medii-timpurii, vor apărea la începutul lunii și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade. La mijlocul lunii martie, începe fereastra agrotehnică (15-20.03) pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei, iar la mijlocul celei de-a treia decade (25.03–5.04) – în Câmpia Dunării.

Sursa: INMH