

Activități dificile de protecție a plantelor la mijlocul lunii martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



La începutul lunii martie, în vestul și centrul Bulgariei au căzut precipitații cuprinse între 20 – 40 l/m², ceea ce a condus la creșterea rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm și 100 cm la culturile agricole.

La mijlocul lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturile medii zilnice în jurul și peste minimul biologic al culturilor agricole de iernat. Procesele lor de vegetație vor decurge în ritm normal. Precipitațiile prognozate în prima jumătate a perioadei, din nou mai semnificative ca cantitate în sud-vestul și centrul Bulgariei, vor favoriza creșterea rezervelor de umiditate în stratul de sol de un metru.

În cursul perioadei, grâul se va afla în faza de înspicare masivă și se va observa o creștere a coeficientului de înspicare. La rapiță va avea loc ramificarea. La speciile pomicole, vor avea loc umflarea și deschiderea mugurilor, iar la unele semente (piersic, cais) în centrul și estul Bulgariei, va apărea și faza de înflorire. În cursul perioadei, începe termenul agrotehnic pentru semănatul florii-soarelui în sudul Bulgariei.

Precipitațiile prognozate în multe locuri din zonele de câmp vor împiedica realizarea unei lucrări de calitate a solului și implementarea activităților de protecție a plantelor.

Sursa NIMH