

Creșterea semnificativă a temperaturilor la începutul lunii aprilie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



După evenimentele meteorologice de iarnă neobișnuite de la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, care au provocat daune suplimentare culturilor pomicele avansate în dezvoltare, în următoarea perioadă de șapte zile condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare semnificativă.

Pentru primele zile ale perioadei se prognozează o creștere a temperaturilor. În zonele de câmp, valorile lor medii zilnice vor atinge și vor depăși minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă și rapiță.

La sfârșitul perioadei se prognozează o normalizare a condițiilor de temperatură și o activare a proceselor vegetative în culturile semănate toamna și în culturile de primăvară semănate. La sfârșitul primei decadă a lunii aprilie, în grâu și orz se vor observa următoarele faze: înfrățire, trecerea la elongarea tulpinii și faza de elongare a tulpinii, în principal în culturile din părți ale Câmpiei Dunării și în regiunile estice ale țării (stațiile agrometeorologice: Novacene, Silistra, Țarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). În rapița de toamnă se va observa începutul fazei de înmugurire.

Până la sfârșitul primei decadă a lunii aprilie, în multe locuri din regiunile de câmp, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului, ca urmare a precipitațiilor semnificative de la începutul primăverii, va îngreuna efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și semănatul culturilor de primăvară mijlocii-timpurii. Din acest motiv, se așteaptă întârzieri la semănatul florii-soarelui. Termenul agrotehnic pentru semănatul florii-soarelui în Câmpia Dunării este până la mijlocul primei decadă a lunii aprilie, iar până la sfârșitul decadei – în nord-estul Bulgariei, în zonele litorale și în câmpiile înalte din sud-vestul Bulgariei.

Condiții favorabile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor în culturile pomicole neafectate de înghețurile de primăvară vor apărea în a doua jumătate a perioadei.

Sursa NIMH