

Proгноza agrometeorologică pentru luna aprilie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.04.2020 Брой: 4/2020



La începutul lunii aprilie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme schimbătoare și răcoroasă. Precipitațiile prognozate până la mijlocul primei decadii vor menține straturile superioare de sol suprasaturate cu apă în multe zone ale țării, ceea ce va întârzia lucrările de pregătire a solului înainte de semănat și semănarea florii-soarelui. Termenele agrotehnice pentru semănatul florii-soarelui în sudul Bulgariei au expirat la sfârșitul lunii martie. Până la mijlocul primei decade a lunii aprilie este perioada optimă pentru semănatul florii-soarelui în Câmpia Dunării, iar până la sfârșitul decadei – în nord-estul Bulgariei, în zonele litorale și câmpiile înalte din sud-vestul Bulgariei.

O creștere și normalizare a temperaturilor și o activare a proceselor vegetației la culturile de toamnă și la culturile de primăvară semănate este prognozată pentru sfârșitul primei și prima jumătate a celei de-a doua

decade. La mijlocul lunii aprilie, stadiul dominant de creștere al cerealelor de toamnă va fi înălțarea tulpinii, iar pentru rapiță – formarea mugurilor. Pentru rapița în stadiul de mugurare (de la mugur verde la galben), este necesar să se efectueze un monitorizare a prezenței și densității populației unuia dintre cei mai periculoși dăunători – gândacul florii de rapiță. Când populația de dăunători depășește pragul de dăunare economică ($PDE > 5$ gândaci pe plantă), trebuie efectuat un tratament oportun înainte ca rapița să intre în faza de înflorire.

În a doua jumătate a lunii, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm mai rapid, la temperaturi în jurul și peste norma pentru perioadă. Rapița va fi predominant în înflorire deplină. La grâu, vor fi observate stadiile de înălțare a tulpinii și de trecere de la înălțarea tulpinii la înspic. La sfârșitul lunii aprilie, în unele dintre culturile care au intrat în înălțarea tulpinii cel mai devreme – în a doua decadă a lunii martie (stațiile agrometeorologice Silistra, D. Chiflik) – va fi observat și stadiul de înspic. În această perioadă, culturile de cereale de toamnă trebuie monitorizate pentru apariția și activitatea dăunătoare a ploșniței cerealelor, a gândacului frunzelor de cereale și a tripsului grâului.

La începutul celei de-a treia decade, temperatura solului în stratul de 10 cm în zonele de câmp va avea valori potrivite pentru semănatul porumbului boabe, iar la sfârșitul lunii – și pentru culturile de primăvară termofile (bumbac, arahide, fasole, pepeni și pepeni galbeni, etc.).

Precipitațiile semnificative de la începutul primăverii, care în multe locuri au depășit 30-35 l/m², au crescut rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru. În majoritatea țării, cu excepția unor localități din regiunile estice și din sudul îndepărtat, s-au măsurat niveluri ale rezervei de umiditate peste 90% din capacitatea de câmp la cerealelor de toamnă. Precipitațiile așteptate în aprilie, în jurul și peste normă, vor asigura umiditate pentru desfășurarea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor de primăvară semănate și ale culturilor semănate toamna care au intrat în stadiul reproductiv al dezvoltării lor.

Pe parcursul lunii, temperaturile minime prognozate, până la minus 2°C, vor fi încă o încercare pentru pomii fructiferi avansați în dezvoltarea lor. Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor în culturile pomicele neafectate de înghețurile de primăvară vor apărea în a doua jumătate a primei, la începutul celei de-a doua și la mijlocul celei de-a treia decade.

Sursa: INMH