

'Ploi și risc crescut de grindină la începutul lunii mai'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi medii zilnice apropiate de normele climatice pentru primele zece zile ale lunii mai. Se prognozează precipitații extinse pe parcursul perioadei, împreună cu o îmbunătățire a condițiilor pentru vegetația culturilor semănate toamna și a culturilor de primăvară semănate. După seceta intensă de primăvară din regiunile de nord-est, precipitațiile așteptate vor oferi o oportunitate de recuperare pentru o parte din culturile de cereale de toamnă care se află într-o stare critică. Deficitul de umiditate a solului în multe locuri din nord-estul Bulgariei a fost un factor limitativ pentru dezvoltarea grâului și o cauză a îngălbenirii unei părți din suprafețele cultivate.

În regiunile din sud-vest și în cea mai mare parte a Câmpiei Tracice, unde în aprilie au căzut precipitații de semnificație economică – în unele locuri peste 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), starea culturilor de cereale de toamnă este bună.

În următoarea perioadă, în suprafețele de câmp, grâul și orzul vor trece de la faza de înălțare a tulpinii la faza de înspicare și formare a spicei. Pentru porumb și floarea-soarelui, în funcție de datele de semănat, se vor observa fazele de încolțire și formare a frunzelor.

În prima săptămână a lunii mai, nu se prognozează temperaturi minime critice pentru culturile agricole, dar probabilitatea de grindină rămâne ridicată. În caz de avarii cauzate de grindină, se recomandă ca culturile afectate să fie tratate la prima oportunitate cu fungicide care conțin cupru pentru a reduce riscul de infecții secundare.

Sursa: NIMH