

Proгноza agrometeorologică pentru luna iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



În majoritatea zilelor din prima și a doua decadă a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă. La începutul lunii, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai lent, sub temperaturi sub normale. Până la mijlocul primei decade, se prognozează precipitații în multe părți ale țării, îmbunătățind rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm și condițiile pentru vegetația culturilor de primăvară. Precipitațiile de la sfârșitul lunii mai și cele așteptate la începutul lunii iunie s-au dovedit mult prea târzii pentru culturile semănate toamna în multe locuri din estul Bulgariei, unde fazele reproductive ale dezvoltării lor au avut loc sub un deficit crescând de umiditate a solului. Într-o mare parte a regiunilor estice, se prognozează recoltă sever redusă, iar în unele locuri culturile îngălbenite prematur, cu spice slab umplute, nu vor fi recoltate.

După vremea mai rece decât de obicei pentru sezon din a doua jumătate a primei decade, se prognozează o îmbunătățire a condițiilor termice. Pe parcursul decadei, la culturile de cereale de toamnă din câmpiile înalte, va avea loc umplerea bobului. În zonele de câmpie, grâul va fi în faza de coacere lăptoasă, iar până la sfârșitul decadei, în unele locuri, se va observa și începutul fazei de coacere cerată. *În perioada inter-fazică de la umplerea bobului la coacerea lăptoasă, pagube grave la grâu sunt cauzate de larvele de Ploșniță-soarelui. În această perioadă, culturile de grâu trebuie monitorizate pentru prezența dăunătorului, iar dacă densitatea acestuia depășește pragul economic de dăunare, este necesar un tratament oportun.*

La începutul celei de-a doua decade, în zonele de câmpie orzul va fi predominant în faza de coacere cerată, iar rapița va fi în faza de coacere.

În a doua jumătate a lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai rapid. La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade, grâul va fi predominant în faza de coacere.

Până la sfârșitul lunii iunie, o parte din culturile de primăvară vor intra în fazele reproductive ale dezvoltării: la floarea-soarelui se va observa începutul înfloririi, iar la hibridii mai timpurii de porumb – înmugurirea și înflorirea inflorescenței masculine.

Vremea instabilă prognozată în iunie, cu precipitații frecvente, va crea condiții pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice: mană la viile de vie și culturile legumicole, tăciune la pomii fructiferi, etc. Pe parcursul lunii, probabilitatea furtunilor cu grindină va rămâne crescută. După o furtună cu grindină, culturile afectate de fructe și legume trebuie tratate cu fungicide care conțin cupru la prima oportunitate.

Sursa: INMH