

Perioadă cu condiții favorabile creșterii fondului infecțios al bolilor fungice la culturile agricole.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare semnificativă. În ultimele zile ale lunii iunie, nu se prognozează precipitații în zonele de câmp, ceea ce va oferi o oportunitate pentru efectuarea unor tratamente urgente de protecție a plantelor. Vremea instabilă persistentă din perioada trecută a creat condiții pentru creșterea fondului infecțios al unei serii de boli fungice: pojar, găurirea frunzelor și putregaiul brun târziu la pomii fructiferi; mană făinoasă în vite de vie și culturi legumicole, etc. În multe părți ale țării, precipitațiile semnificative au împiedicat recoltarea culturii de cereale coapte. În unele culturi de grâu inundate, a început înnegrirea spicei, ceea ce prezintă un risc de deteriorare a calității boabelor.

În perioada următoare, dezvoltarea culturilor de primăvară va progresa într-un ritm accelerat, cu temperaturi în jurul și peste normele climatice pentru începutul verii și cu rezerve bune până la foarte bune de umiditate în straturile superioare ale solului. În majoritatea părților țării, cu excepția regiunilor extreme nord-vestice (stația agrometeorologică Buzovets) și sud-vestice (stația agrometeorologică Sandanski), rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm se află la niveluri peste 75–80% din capacitatea de câmp. În această perioadă, floarea-soarelui se va afla în fazele de formare a inflorescenței și înflorire, în principal în culturile din regiunile sudice. La hibridii timpurii de porumb, se vor observa fazele de înțepare și înflorire a mănunchiului, în timp ce la hibridii mai târzii – formarea frunzelor. La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, culturile de porumb ar trebui inspectate pentru prezența unuia dintre cei mai importanți dăunători – molia porumbului, iar atunci când densitatea acesteia depășește pragul economic de dăunare (10 aglomerări de ouă la 100 de plante), este necesar un tratament (împotriva larvelor tinere înainte ca acestea să pătrundă în tulpini).

La începutul lunii iulie, se prognozează din nou precipitații, iar condițiile pentru efectuarea celei mai importante activități – recoltarea grâului – se vor deteriora.

Sursa: NIMH