

Proгноza agrometeorologică pentru luna iulie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



În prima jumătate a primei decade a lunii iulie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge în condiții termice peste normal. La începutul lunii, în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor extreme nord-vestice (stația agrometeorologică Buzovets) și sud-vestice (stația agrometeorologică Sandanski), vegetația culturilor de primăvară va avea loc în condiții de rezerve bune de umiditate a solului în straturile de 50 cm și 100 cm (peste 75-80% din capacitatea de câmp) – ca urmare a precipitațiilor semnificative, peste normal din iunie, care în unele locuri au depășit 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tărnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrici – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlăk – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardjali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

În prima decadă, în funcție de precocitatea hibrizilor de porumb, vor apărea diverse faze: formarea frunzelor, înmugurirea, înflorirea câmpii și formarea știuleților. La floarea-soarelui, în suprafețele de câmp va predomina faza de înflorire, iar în culturile de pe terenurile mai înalte – formarea inflorescenței. La leguminoasele pentru boabe (fasole, soia), se va observa formarea păstăilor.

În a doua și la începutul celei de-a treia decade, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm moderat, la temperaturi în jurul și ușor sub normalul perioadei. Precipitațiile frecvente prevăzute în această perioadă vor avea un efect benefic asupra culturilor de primăvară care se află în stadiul reproductiv al dezvoltării, când cerința de apă crește brusc (la porumb, în perioada de la înmugurire până la coacerea lăptoasă, consumul zilnic de apă atinge 6-7 m³/decar). La începutul celei de-a treia decade a lunii iulie, o parte din hibrizii de porumb timpurii din suprafețele de câmp vor intra în stadiul de coacere lăptoasă. La floarea-soarelui, va avea loc formarea și umplerea semințelor. La sfârșitul lunii, în culturile semănate în termenul agrotehnic, în unele locuri din Câmpia Dunării și în regiunile sudice, se va observa începutul fazei de coacere.

În ultima săptămână a lunii iulie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme relativ uscată, caldă și caniculară, ceea ce va impune aplicarea unui regim de irigație adecvat pentru hibrizii de porumb târzii și culturile legumicole din producția de câmp târzie. Condițiile meteorologice din această perioadă vor limita dezvoltarea unei serii de boli fungice, cu excepția făinărilor la culturile legumicole și pomii fructiferi, și a făinării (oidiul) la vița de vie.

În luna iulie, tratamentele de protecție a plantelor în culturile pomicole împotriva celei de-a doua generații de viermele mărului, afidelor și acarienilor nu trebuie subestimate. Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor apărea în majoritatea zilelor primei și a treia decade, în orele mai răcoroase ale zilei.

În perioadele cele mai călduroase ale lunii iulie, cu temperaturi maxime de până la 38-39°C, riscul de incendii în timpul recoltării cerealelor va crește.

Sursa: INMH