

Proгноza agrometeorologică pentru luna august

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.08.2020 Брой: 8/2020



Fereastra agrotehnică pentru semănatul rapiței începe în a treia decadă a lunii august. În august, pentru soiurile târzii de pomi fructiferi, activitatea dăunătoare a ultimei generații de viermi de fructe nu trebuie subestimată. Vremea relativ uscată din majoritatea zilelor lunii va fi o premisă pentru creșterea populațiilor de acarieni. În livezi este necesar să se monitorizeze apariția și densitatea omizilor generației a treia a moliei strugurilor.

În august, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații apropiate de normele climatice pentru lună.

La începutul lunii august, dezvoltarea culturilor de primăvară târzii în majoritatea zonelor țării va avea loc în condiții de deficit de umiditate a solului în adâncime. Excepții se vor înregistra în unele locuri din nord-vestul Bulgariei și în câmpia Sofia, unde precipitațiile din iulie au depășit normele lunare (Novo Selo - 84 l/m², Vrața - 128 l/m², Montana - 88 l/m², Sofia - 111 l/m², Kyustendil - 72 l/m², Dragoman - 56 l/m²) și au crescut nivelul rezervelor de umiditate din stratul de sol de 50 și 100 cm. În regiunile vestice ale țării, precipitațiile prognozate în a doua jumătate a primei decade a lunii august vor asigura umiditatea necesară vegetației hibrizilor mai târzii de porumb și a culturilor secundare.

În Bulgaria de Est și în regiunile sudice, nu se așteaptă precipitații în prima decadă a lunii august, iar în unele locuri seceta în agravare va pune sub semnul întrebării recolta culturilor de primăvară cultivate în condiții neirigate. În unele dintre aceste regiuni, ca urmare a precipitațiilor sărace din iulie - în locuri sub 2-3 l/m² (Ruse, Șabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardjali), rezervele de umiditate a solului din stratul de 50 și 100 cm sunt complet epuizate (stația agrometeorologică Sliven).

Până la mijlocul lunii august, temperaturile ridicate prognozate, cu valori maxime de până la 36-38°C, vor duce la scurtarea perioadelor interfazice în dezvoltarea culturilor de câmp târzii. Valorile de acest ordin, combinate cu umiditatea atmosferică scăzută, vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole din producția de câmp târzie.

În prima decadă a lunii august, hibrizii mai timpurii de porumb își vor finaliza dezvoltarea, iar hibrizii semi-timpurii vor intra în faza de coacere lăptoasă. La floarea-soarelui în Câmpia Dunării și în regiunile sudice, se va observa faza de maturare. La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade în regiunile de câmp, floarea-soarelui va fi predominant la maturitate tehnică. În a treia decadă, hibrizii semi-târzii de porumb vor intra în coacerea cerată. La orez se va observa faza de coacere lăptoasă, la soia - faza de maturare, iar la bumbac - începutul deschiderii capsulelor.

Probabilitatea precipitațiilor, îmbunătățirii stării hidrofizice a solului în straturile superioare și a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare de semănat pe suprafețele destinate semănatului cu rapiță de toamnă, este prognozată pentru a doua jumătate a celei de-a treia decade. Fereastra agrotehnică pentru semănatul rapiței începe în a treia decadă a lunii august.

În august, pentru soiurile târzii de pomi fructiferi, activitatea dăunătoare a ultimei generații de viermi de fructe nu trebuie subestimată. Vremea relativ uscată din majoritatea zilelor lunii va fi o premisă pentru creșterea populațiilor de acarieni. În livezi este necesar să se monitorizeze apariția și densitatea omizilor generației a treia

a moliei strugurilor. Tratamentele de protecție a plantelor trebuie efectuate în orele mai răcoroase ale zilei cu produse care au un interval pre-recoltă adecvat, în concordanță cu perioada de coacere a culturilor.

Sursa: INMH