

Prognoză agrometeorologică pentru septembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 Брой: 9/2020



Și în septembrie, condițiile agrometeorologice din vestul Bulgariei vor diferi semnificativ de cele din regiunile estice ale țării.

În Bulgaria de Est, acestea vor fi determinate de temperaturi peste normal și precipitații sub normal. În multe locuri din regiunile estice, ca urmare a secetei prelungite de vară, culturile de primăvară și-au încheiat vegetația prematur. În aceste zone, recolta de floarea-soarelui și a hibrizilor timpurii de porumb a început mai devreme decât termenele obișnuite, cu randamente cu mult sub media țării.

În septembrie, în majoritatea regiunilor vestice, etapele finale de dezvoltare ale culturilor agricole târzii vor avea loc sub temperaturi peste normal, cu precipitații apropiate de normele climatice și cu rezerve bune de umiditate

a solului la sfârșitul verii în straturile de 50 și 100 cm (peste 70% din capacitatea de câmp – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – ca urmare a precipitațiilor peste normal din august (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofia – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

În prima decadă a lunii septembrie, se prognozează din nou precipitații de semnificație agronomică pentru jumătatea vestică a țării. Acestea vor avea un efect benefic asupra culturilor secundare și a hibrizilor târzii de porumb, care vor fi în stadiul de coacere lăptoasă. În această decadă, în suprafețele de câmp, hibrizii semi-târzii vor intra în stadiul de coacere cerată. Până la mijlocul lunii, o parte dintre hibrizii târzii își vor finaliza dezvoltarea. În a doua decadă, orezul va fi în stadiile de coacere cerată și deplină. În a treia decadă, stadiul de coacere va avea loc la bumbac, arahide, soiurile de pomi fructiferi de toamnă și soiurile mai târzii de viță-de-vie. Pentru întreaga lună, valorile minime de temperatură prognozate sunt peste pragurile critice pentru culturile legumicole, ceea ce este o premisă pentru obținerea de producție suplimentară de legume din cultivarea de câmp târzie.

În majoritatea zilelor din a doua și a treia decadă, se așteaptă vreme relativ uscată, iar condițiile vor fi potrivite pentru curățarea suprafețelor de culturile de primăvară.

Și în septembrie, în cea mai mare parte a regiunilor estice, lipsa de umiditate din straturile superioare ale solului va împiedica executarea calitativă a arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță de toamnă și culturi cerealiere de toamnă. Termenul optim pentru semănatul rapiței este până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii. În a treia decadă, încep termenele agrotehnice de semănat pentru orz și grâu în câmpurile de la altitudini mai mari.

Sursa: NIMH