

Toamnă caldă și uscată ne așteaptă în octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



La începutul toamnei, după seceta prelungită, condițiile agrometeorologice au înregistrat o schimbare pozitivă. Precipitațiile, în multe zone ale țării depășind 20–30 l/m² (Vrața, Kneaja, Oriahovo, Sofia, Dragoman, Kiustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlâk, Kardjali, Elhovo, Razgrad, Burgas), au sporit umiditatea din straturile superioare ale solului, ceea ce este de o importanță majoră pentru realizarea corectă a lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. Excepții există în unele părți ale Câmpiei Traciei și în regiunile estice, unde precipitațiile de la sfârșitul lunii septembrie nu au avut semnificație economică.

În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice și precipitații sub norma lunară.

În prima decadă, nu se prognozează precipitații semnificative, iar în majoritatea suprafețelor de câmp condițiile vor permite efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și semănatul culturilor de toamnă. Anul acesta, seceta a împiedicat semănatul rapiței de toamnă, iar o mare parte din suprafețele planificate vor fi semănate în octombrie – după termenele agrotehnice. Probabilitatea este crescută ca plantele semănate mai târziu să nu poată forma o rozetă (7–8 frunze) până la sfârșitul vegetației de toamnă, o fază în care rapița iernează cu succes.

Octombrie este perioada optimă pentru semănatul cerealelor de toamnă. În prima jumătate a lunii este termenul agrotehnic pentru semănatul grâului în Bulgaria de Nord, în a doua jumătate – pentru Bulgaria de Sud, iar în a treia decadă – pentru zonele de lângă coasta Mării Negre.

În prima decadă, temperaturile ridicate sezoniere prognozate, cu valori maxime de până la 25–30°C, vor accelera coacerea soiurilor târzii de struguri pentru vin și vor asigura condiții pentru obținerea de producție suplimentară de la culturile legumicole ale producției de câmp târzii.

După vremea neobișnuit de caldă din a doua jumătate a lunii octombrie, se așteaptă o normalizare treptată a condițiilor termice. Precipitațiile prognozate în a doua și prima jumătate a celei de-a treia decade vor fi de o importanță majoră pentru desfășurarea normală a fazelor inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate. La sfârșitul lunii octombrie, în funcție de datele de semănat, la grâu se vor observa următoarele faze: încolțire, a treia frunză și începutul încărcării la plantele semănate cel mai devreme, semănate la începutul lunii octombrie.

Temperaturile peste normă prognozate pe parcursul lunii vor crea condiții pentru creșterea populației anumitor dăunători – șoarecele de câmp. În octombrie, culturile de toamnă trebuie monitorizate și, atunci când populația de șoareci depășește pragul economic de dăunare (2 colonii active pe decar), este necesară lupta cu rodenticide autorizate (granule Phostoxin) – momele otrăvitoare care se așază la intrările coloniilor.

În majoritatea zilelor lunii, condițiile vor fi potrivite pentru recoltarea culturii pomicole. În livezile de măr și păr afectate de tăciune, pentru reducerea inoculului, este recomandabil, la începutul căderii frunzelor, după recoltarea fructelor, să se efectueze un tratament cu soluție de uree de 5%.

Pentru speciile cu sâmbure, după căderea în masă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu amestec Bordeaux 2% împotriva agenților cauzatori ai găurilor de glonț, putregaiului brun timpuriu, buclei frunzelor de piersic etc.