

Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere în mijlocul lunii octombrie

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



În mijlocul lunii octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi apropiate de norma pentru a doua decadă a lunii octombrie. Precipitațiile semnificative din perioada trecută au depășit 40-50 l/m² în multe zone ale țării (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Pleven - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), ceea ce a condus la o îmbunătățire semnificativă a rezervelor de umiditate a solului în straturile superioare și a condițiilor pentru stadiile inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate. La începutul perioadei, se preconizează precipitații suplimentare și o creștere a rezervelor de umiditate a solului în

stratul de 50 cm. În multe locuri din vestul și centrul Bulgariei, acestea vor atinge niveluri de până la și peste 75% din capacitatea de câmp. Se așteaptă, de asemenea, o schimbare pozitivă a nivelurilor de umiditate a solului în regiunile de nord-est ale țării, care au fost cele mai afectate de seceta prelungită.

La mijlocul perioadei, se prognozează o scădere substanțială a temperaturilor, iar în câmpurile din bazin – valori minime critice pentru culturile legumicole sensibile la îngheț. Dezvoltarea culturilor de toamnă semănate la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade va avea loc în condiții termice sub normale. La grâu și orzul semănate în prima decadă a lunii octombrie, va predomina stadiul de încolțire. La culturile de cereale de toamnă semănate mai devreme, la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, se va observa formarea frunzelor (1–2 frunze).

O îmbunătățire a condițiilor pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere, dintre care cea mai importantă este semănatul grâului, este așteptată la sfârșitul perioadei. Următoarea perioadă de șapte zile coincide cu termenul agrotehnic pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă în sudul Bulgariei.

În a treia decadă a lunii octombrie, în culturile de grâu semănate mai devreme, trebuie monitorizată densitatea populației anumitor dăunători: șoarecele de câmp comun, gândacul frunzelor de grâu, muștele cerealelor etc., care provoacă daune serioase culturilor de cereale de toamnă în stadiile inițiale ale vegetației acestora.

Sursa: NIMH