

Condiții favorabile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului și pentru semănatul grâului și orzului la sfârșitul lunii octombrie.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.10.2020 Брой: 10/2020



Cei 10–20 l/m² de precipitații căzuți în perioada precedentă în regiunile Vratsa, Knezha, Pleven, Lovech, Sofia, Razgrad au menținut o bună umiditate în straturile superioare ale solului și au îmbunătățit condițiile pentru dezvoltarea culturilor de toamnă semănate. În a doua jumătate a perioadei, în unele localități (Kyustendil, Sofia, Dragoman, Kazanlak), s-au înregistrat primele înghețuri de toamnă și temperaturi minime critice pentru culturile legumicole din producția de câmp târzie.

În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normă. Nu se prognozează valori minime critice și risc de îngheț. În cursul perioadei, la grâu și orz, în funcție de datele de semănat, se vor observa diferite faze – de la încolțire până la începutul formării frunzelor. În a treia decadă a lunii octombrie, este în curs termenul agrotehnic pentru semănarea culturilor de cereale de toamnă în regiunile de coastă a Mării Negre.

Cantitățile de precipitații înregistrate la sfârșitul primei și în cursul celei de-a doua decade a lunii octombrie au îmbunătățit umiditatea solului în straturile superioare. În stratul de sol de cincizeci de centimetri, conținutul de umiditate al solului este de 75-80% din capacitatea de câmp. Acest lucru a îmbunătățit condițiile pentru lucrările solului, semănat și dezvoltarea inițială a culturilor de cereale de toamnă și a rapiței de toamnă.

În majoritatea zilelor perioadei, nu se prognozează precipitații semnificative, iar condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere ale solului, pentru semănarea grâului și orzului, pentru recoltarea fructelor de la speciile târzii de pomi fructiferi și pentru desfășurarea activităților fitosanitare în culturile permanente. Condițiile vor permite inspectarea suprafețelor cultivate cu cereale de toamnă pentru prezența și activitatea dăunătoare a șoarecelui de câmp comun și a gândacului frunzelor de grâu.

Sursa: NIMH