

Îngrijirea protecției plantelor pentru viță de vie și specii de pomi fructiferi toamna

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.11.2020 Брой: 11/2020



Specii de fructe

Mere și pere

În majoritatea zilelor din octombrie, condițiile vor fi potrivite pentru recoltarea fructelor. În livezile de mere și pere afectate de tăciune, pentru a reduce infecția, este recomandabil, la începutul căderii frunzelor și după recoltarea fructelor, să se efectueze un tratament cu o soluție de uree de 5%. După o inspecție amănunțită și detectarea infecțiilor târzii, precum și împotriva bolilor care se dezvoltă în timpul depozitării produselor, se efectuează tratament cu Topsin M 70 WDG - 0,1% sau Top Plus 70 WP - 0,1%. Pentru o bună păstrare a merelor și perelor

și pentru reducerea putregaiurilor și degradării în timpul depozitării, se recomandă de asemenea efectuarea unui tratament post-recoltare cu Topsin M 70 WG - 0,120%. După pulverizare, fructele sunt lăsate să se usuce și apoi așezate în camere frigorifice de depozitare sau în spații adânci și răcoroase de pivniță.

Specii de fructe cu sâmbure

Pentru speciile de fructe cu sâmbure, după căderea în masă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu amestec Bordeaux 2% împotriva agenților cauzatori ai găuririi frunzelor, putregaiului brun timpuriu, bubocului de piersic etc.

În aceste condiții climatice, mediul este favorabil și pentru apariția și înmulțirea insectelor și acarienilor polivoltini. Aceștia își dezvoltă ultimele generații, a căror densitate a populației va determina în mare măsură pagubele din anul următor. Pe parcursul lunii, se creează condiții pentru formarea rouării abundente, care este o cauză a infecțiilor cu mană pe roșiile târzii și altele.

Vii

În această perioadă, putregaiul cenușiu (Botrytis) provoacă pagube semnificative viței de vie, de la colorarea boabelor până la consum. Prin urmare, în vreme umedă și răcoroasă, se efectuează tratament cu Topsin M 70 WDG - 0,2%, Switch 62,5 WG – 100 g/ha, Shavit F 72 WDG – 0,2% (200 g/ha), Quadris 25 SC – 0,075%.

În acest timp, zboară și adulții generației a treia a moliei strugurilor. Larvele provoacă pagube boabelor de strugure care se coc sau sunt deja coapte. Pentru combaterea dăunătorului, la soluția de pulverizare fungică se adaugă un piretroid autorizat.

Vița de vie tânără de un an este acoperită cu pământ la 3–5 cm deasupra punctului de altoire și astfel pregătită pentru sezonul de iarnă.

În conformitate cu Legea protecției plantelor, agricultorii sunt obligați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor autorizate pentru cultura și dăunătorul respectiv, și la doza corespunzătoare.