

Prognoză agrometeorologică pentru sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



La sfârșitul lunii noiembrie, țara s-a trezit sub un strat de zăpadă. În noaptea trecută, prima zăpadă a sezonului a căzut în vestul Bulgariei. Temperaturile au scăzut sub zero, drept urmare precipitațiile din Sofia, Razgrad, Pernik și Kyustendil s-au transformat în zăpadă. Se așteaptă ca stratul de zăpadă să ajungă până la 5 cm, cu excepția Câmpiei Dunărene, unde grosimea acestuia va fi între 10–15, iar în unele locuri până la 20 cm.

La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, condițiile agrometeorologice vor fi din ce în ce mai dinamice. La începutul perioadei, acestea vor fi determinate de o vreme blândă pentru sezon, cu temperaturi medii zilnice în majoritatea zonelor de câmpie în jurul și peste minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă și rapiță de toamnă.

În această perioadă, se prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Răcirea așteptată va duce la o încetinire, iar în câmpiile mai înalte și în Pre-Balkan, unde se prognozează precipitații inclusiv sub formă de zăpadă, la o încetare a proceselor vegetative la culturile semănate toamna. Excepții vor apărea în unele locuri din regiunile de sud-est și de-a lungul litoralului Mării Negre, unde se va observa o vegetație slab exprimată a culturilor de cereale de toamnă.

La începutul lunii decembrie, în culturile de grâu semănate în perioada agrotehnică, în octombrie, se va observa faza de încovoietoare, în care culturile de cereale de toamnă iernează cu succes. Faza celei de-a treia frunze va predomina în culturile semănate la începutul lunii noiembrie. Culturile semănate târziu, la mijlocul lunii noiembrie, nu sunt bute înființate și se află în fazele de încolțire și formare inițială a frunzelor. La rapiță, faza de rozetă, faza potrivită pentru iernare, se va observa în culturile semănate la începutul toamnei.

În perioada următoare, se așteaptă precipitații și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului din straturile superioare ale solului. Ca urmare a precipitațiilor sub normale din noiembrie, rezervele de umiditate a solului în straturile de 50 și 100 cm din culturile de grâu din majoritatea țării sunt neobișnuit de scăzute pentru sezon – în unele locuri din regiunile estice și extreme sudice sub 60% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

La începutul perioadei următoare, condițiile vor fi potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi și pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă la culturile pomicole.

Pentru a proteja culturile pomicole de frigul iernii, pentru a distruge lichenii și mușchii, precum și pentru a respinge ploșnița marmorată maro și molia leopard, este necesar să se trateze trunchiurile și ramurile groase ale pomilor cu un amestec de var de 20% la care se adaugă o cantitate mică de argilă.

Sursa: NIMH