

Proгноza agrometeorologică la începutul anului

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



Temperaturile peste normal din luna decembrie, cu valori maxime atingând 17-18°C în multe locuri din zonele de câmpie (Knezha, Pleven, Lovech, Veliko Tărnovo, Ruse, Silistra, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora, Șirpan, Elhovo, Varna, Burgas), au prelungit procesele vegetative la culturile semănate toamna. Temperaturile neobișnuit de ridicate au declanșat umflarea prematură a mugurilor la unele specii de pomi fructiferi cu înflorire timpurie (piersic, cireș), ceea ce va duce la reducerea rezistenței lor la frig.

În prima decadă a lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normal. La începutul lunii, în multe locuri din zonele de câmpie, valorile lor medii zilnice vor depăși din nou minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă.

Răcirea și încetarea proceselor vegetative la culturile semănate toamna sunt așteptate în a doua jumătate a primei decade.

În a doua și a treia decadă, temperaturile prognozate, apropiate de normele climatice, vor menține cerealele de toamnă și rapița într-o stare de repaus. Zăpada așteptată pe scară largă va îmbunătăți condițiile de iernare ale culturilor semănate toamna. Grâul a intrat în iarnă în diferite stadii fenologice, ca urmare a secetei prelungite de toamnă și a semănatului întârziat. Cerealele de toamnă semănate târziu, la sfârșitul toamnei, nu sunt bine înrădăcinate și se află în stadiile de încolțire și formare timpurie a frunzelor în unele locuri din regiunile sudice ale țării (stații agrometeorologice – Plovdiv, Haskovo, Liubimeț, Sliven, Iambol). O parte semnificativă a culturilor de grâu va ierna în stadiul de trei frunze. În stadiul de încărcare, care este stadiul potrivit pentru iernare, se află cerealele de toamnă semănate în perioada agrotehnică optimă (stații agrometeorologice – Bazoveț, Novacene, Pavlikeni, Târgoviște, Sandanski, Pazardjik, Karnobat, Dolni Ciflik).

În ianuarie, temperaturile minime prognozate, până la minus 15°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru cerealele de toamnă neîncărcate și pentru culturile de rapiță de toamnă care nu au reușit să formeze o rozetă în timpul vegetației de toamnă.

Precipitațiile așteptate în ianuarie, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate a solului în stratul de 100 cm. Precipitațiile peste normal din decembrie (Kărdjali – 194 l/m², Haskovo – 142 l/m², Sliven – 125 l/m², Stara Zagora – 123 l/m², Silistra – 109 l/m²) au crescut brusc rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului. La începutul iernii, în culturile de grâu, rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm în majoritatea zonelor de câmpie au atins niveluri peste 85-90% din capacitatea de câmp (CC).

În ianuarie, condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierilor de iarnă în livezi și vii vor apărea în a treia decadă.

Sursa: INMH