

În a doua jumătate a lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare semnificativă.

Автор(и):

Дата: 20.01.2021 Брой: 1/2021



La începutul lunii ianuarie, în diferite părți ale țării s-a înregistrat precipitații peste normal – 90-100 l/m² (Vidin - 109 l/m², Vrața - 125 l/m², Dragoman - 128 l/m², Blagoevgrad - 128 l/m², Sandanski - 136 l/m², Haskovo - 101 l/m², Kardjali - 129 l/m², Şumen - 113 l/m², Varna - 122 l/m², Elhovo - 140 l/m², Karnobat - 120 l/m², Burgas - 153 l/m²). Acest lucru a dus la inundarea unor suprafețe cu culturi semănate toamna.

În același timp, Institutul Agricol Dobrogea raportează că astfel de ploi abundente și saturante nu au avut loc în ultimii doi ani, în special în această perioadă a anului. Potrivit prof. Ivan Kiryakov, ploile au asigurat umiditate

productivă pentru culturile de toamnă și se observă deja rezerve de umiditate la o adâncime de 1 până la 1,50 m.

În a doua jumătate a lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. Răcirea așteptată la începutul perioadei va restabili starea de repaus la cerealele de toamnă și rapiță, inclusiv în regiunile sudice ale țării. Aceasta va împiedica o dezvoltare prematură și nedorită la unele specii de pomi fructiferi cu înflorire timpurie din regiunile de câmp, declanșată de temperaturile neobișnuit de ridicate de la începutul iernii. În cursul perioadei, temperaturile minime prevăzute până la minus 10°C sunt peste pragurile critice pentru iernarea cerealelor de toamnă în faza de trei frunze și încălțire, precum și pentru plantările de rapiță care au reușit să formeze o rozetă în timpul vegetației de toamnă. În absența stratului de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, aceste valori vor prezenta un risc pentru plantările de grâu și orz semănate târziu care au încetat vegetația în stadiul de formare inițială a frunzelor (1-2 frunze).

În cursul perioadei, în zonele cu temperaturi negative scăzute, va exista o probabilitate crescută de îngheț a stratului superficial de sol la culturile semănate toamna și suprasaturate cu apă, ceea ce este o condiție prealabilă pentru ridicarea la helciu și avarierea mecanică, în special la cerealele de toamnă semănate târziu și slab înrădăcinate. La sfârșitul perioadei, se prognozează o perioadă mai blândă și o îmbunătățire a condițiilor pentru efectuarea tăierilor în livezi și vii.

Următoarea perioadă este potrivită pentru semănatul semințelor în instalații de cultură protejată pentru creșterea răsadurilor de legume destinate producției timpurii de legume în câmp. Termenele de semănat trebuie aliniate cu durata perioadei de răsad și cu caracteristicile climatice ale regiunii. Durata perioadei de răsad pentru roșii este de aproximativ 80 de zile, iar pentru ardei și vânăță – 75-85 de zile. Răsadurile trebuie să atingă stadiul adecvat pentru transplantare în câmp după datele înghețurilor târzii de primăvară obișnuite pentru regiunea respectivă.