

Proгноza agrometeorologică pentru februarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 Брой: 2/2021



În prima decadă a lunii februarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normal, iar în multe locuri din zonele de câmpie, valorile lor medii zilnice vor atinge minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

La sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade, se așteaptă o scădere a temperaturilor, care va împiedica vegetația prematură la culturile semănate toamna și la unele specii de sâmbure cu înflorire timpurie din regiunile de câmpie ale țării. În a doua decadă, temperaturile medii zilnice prognozate vor fi apropiate de normele climatice și vor menține culturile agricole de iarnă în stare de repaus.

În a treia decadă, condițiile agrometeorologice vor fi din nou determinate de temperaturi peste normal, ceea ce va tulbura repausul relativ al culturilor semănate toamna și repausul forțat al unor culturi pomicole cu înflorire timpurie. La sfârșitul lunii februarie, la culturile de cereale de toamnă, în unele locuri din sudul Bulgariei și de-a lungul litoralului Mării Negre, se vor crea condiții pentru o vegetație întârziată, dar nu se așteaptă o modificare semnificativă a stării fenologice a culturilor. La grâu, se vor observa fazele de creștere ale celui de-al treilea frunz și ale încărcării. În regiunile extreme sudice și sud-estice, la unele specii de sâmbure cu înflorire timpurie (migdal, piersic, cireș), va avea loc umflarea mugurilor și, în unele locuri, începutul deschiderii acestora.

În februarie, valorile prognozate ale temperaturilor minime, până la minus 12-13°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu o durată mai prelungită, vor prezenta un risc pentru culturile de cereale de toamnă semănate târziu care au încetat vegetația în faza de 2-3 frunze, precum și pentru culturile de rapiță care nu au reușit să formeze o rozetă în timpul vegetației de toamnă.

Precipitațiile așteptate pe parcursul lunii, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate din stratul de sol de doi metri. Ca urmare a precipitațiilor din ianuarie, peste normal, care în multe locuri din țară au depășit 140-150 l/m² (Vrața -146 l/m², Șumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardjali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), rezervele de umiditate a solului din stratul de un metru la culturile de cereale de toamnă au atins niveluri apropiate de capacitatea de câmp (CC).

În prima și a doua decadă a lunii februarie, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului va limita posibilitățile de desfășurare a unor activități agrotehnice – fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate, pregătirea pre-semănată a suprafețelor destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii (mazăre, mazărice, ovăz, orz de primăvară). Condiții mai potrivite pentru tăieri în livezi și vii, precum și pentru tratamentele de protecție a plantelor de iarnă în livezi, vor fi disponibile în majoritatea zilelor din prima și a treia decadă a lunii februarie.

Sursa: INMH