

Perioade critice pentru boli și dăunători

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Floarea-soarelui

Încolțire – frunza 4–5 – gândacii (gândacul cenușiu al porumbului *Tanymecus dilaticolis*, gândacul negru al sfeclei *Psallidium maxilosum*)

Încolțire – formarea mugurilor – mană *Plasmopara halstedii*

Germinare – încolțire – înflorire – putregaiul cenușiu *Botrytis cinerea*

Cotiledoane – începutul înfloririi – rugină *Puccinia helianthi*

Frunza 5–6 – formarea mugurilor – pete cenușii pe frunze *Diaporthe helianthi*, pete brune pe frunze *Alternaria* sp., putregaiul cărbunos *Macrophomina phaseolina*, verticilioza *Verticillium* sp.

Înflorire – coacere galbenă – scleroținioza *Sclerotinia sclerotiorum*

Înflorire – umplerea semințelor – putregaiul uscat al capitulelor *Rhizopus* sp.

Porumb

Înainte de semănat – în timpul semănatului – frunza 6–7 – viermii-sârmă din familia *Elateridae*

Germinare – putregaiul semințelor și răsadurilor *Fusarium* sp., *Aspergillus* sp., *Nigrospora oryzae*

Încolțire – frunza 5–7 – gândaci (gândacul cenușiu al porumbului *Tanymecus dilaticolis* și gândacul cenușiu al sfeclei *Tanymecus palliatus*), viermii tăietori din familia *Noctuidae*

De la începutul vegetației – afide *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

Frunza 1–9 – boli virale (mozaicul pitic al porumbului *Maize dwarf mosaic virus* și mozaicul în dungi al grâului *Wheat streak mosaic virus*)

Frunza 5–6 – înflorire – tăciunele obișnuit *Ustilago zeae*

Frunza 6–8 – înmugurire – molia porumbului *Ostrinia nubilalis*, viermele capsului bumbacului *Helicoverpa armigera*

Înflorire – coacere lăptoasă – putregaiul tulpinii *Fusarium* sp., arsura frunzelor *Helminthosporium turcicum*

Coacere lăptoasă – coacere deplină – fuzarioza știulețului

Rapiță

Cotiledoane – formarea rozetei – purici de crucifere din genul *Phyllotreta*: puricele negru al varzei (*Phyllotreta atra* L.), puricele ondulat (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) și alții, puricele tulpinii rapesei (*Psylliodes chrysocephala* L.), musca-fierăstrău a frunzelor de rapiță (*Athalia rosae* Christ.), gândacul rapiței (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Alungirea tulpinii – formarea pedunculilor florali - ploșnița varzei (*Eurydema ornata* L.), ploșnița napului (*Eurydema oleraceum* L.), fluturașul alb mare al varzei (*Pieris brassicae* L.), fluturașul alb mic al varzei (*Pieris*

rapae L.), molia varzei (*Mamestra brassicae* L.), gărgărițele semințelor din genul *Ceutorhynchus*.

Formarea mugurilor – înflorire - gărgărița florilor de rapiță (*Meligethes aeneus* F.), gărgărița păroasă (*Tropinota hirta* Poda.), gărgărițele semințelor din genul *Ceutorhynchus*: gărgărița tulpinii rapesei (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), gărgărița tulpinii varzei (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (sinonim *Ceutorhynchus quadridens*).

Formarea păstăilor – gărgărița păstăilor (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), afida varzei (*Brevicoryne brassicae* L.), țânțarul păstăilor (*Dasineura brassicae* Winn.).

Monitorizați culturile și luați măsuri la timp!