

Psihila comună a părului - *Psylla pyri*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.02.2021 Брой: 2/2021



Daune:

Adulții, larvele și nimfele provoacă daune prin sucarea sevei din mugurii, frunzele, florile, fructele și lăstarii părului;

În timpul hrănirii, psilidele excretă „mana”, care contaminează părțile infestate, deoarece pe aceasta se dezvoltă ulterior ciuperci fumagine;

Provoacă îmbătrânirea prematură a lăstarilor, ramurilor și frunzelor prin creșterea conținutului lor de azot;

Cel mai sever impact negativ asupra pomilor rezultă din transmiterea mycoplasmei, care blochează vasele conducătoare;

În cazul multiplicării în masă, provoacă slăbirea și moartea pomilor de păr;

Iernează ca adult sub frunzele căzute, în crăpături și sub scoarța veche, crăpată a trunchiului și în alte locuri potrivite.

Combatere:

Perioadele principale de combatere sunt toamna, pentru reducerea populației de iernat înainte de mișcarea sa în masă către locurile de iernat, și la începutul primăverii;

Tratamentul de primăvară trebuie efectuat cât mai devreme, în primele zile călduroase din februarie sau martie, când temperatura rămâne timp de trei sau mai multe zile peste 5 - 8°C;

Combaterea în acest moment este din nou îndreptată împotriva adulților, când aceștia părăsesc locurile de iernat și se mută pe ramurile scurte și asemănătoare unor saci ale părului;

Pragul economic al daunelor - 1 adult și 8-10 ouă pe 8-10 ramuri asemănătoare unor saci;

Stropire cu insecticide înregistrate.

Udarea temeinică a pomilor cu soluția de stropit (150-180 l/ha).