

Proгноza agrometeorologică pentru luna martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



După scurtul episod de frig de la începutul lunii martie, în majoritatea zilelor din prima jumătate a lunii, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de normele climatice și de minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. În această perioadă, în regiunile sudice ale țării se vor crea condiții pentru declanșarea vegetației la culturile semănate toamna.

Pentru a doua jumătate a celei de-a doua decadă este prognozată o creștere substanțială a temperaturilor și o activare a proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă și la plantațiile perene.

În a treia decadă, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm accelerat, în condiții termice peste norma. La sfârșitul lunii, grâul și orzul se vor afla predominant în faza de încolțire, cu o trecere la înălțarea

tulpinii în culturile din unele regiuni sudice și sud-estice ale țării. La rapița de toamnă, care a iernat în stadiul de rozetă, se va desfășura pe scară largă ramificarea.

În luna martie, la culturile pomicole se vor observa diverse stadii fenologice – de la umflarea și deschiderea mugurilor până la stadiile de buchet verde și înflorire la speciile cu înflorire timpurie de sămburi – migdal, cais, piersic, în regiunile sudice și local în Câmpia Dunării, unde temperaturile peste norma din februarie au provocat o dezvoltare prematură în livezi.

În martie, temperaturile minime prognozate, până la minus 7°C, vor prezenta un risc pentru cele mai avansate culturi pomicole aflate în stadiile de formare a mugurilor și înflorire.

Precipitațiile așteptate în martie, apropiate de norma lunară, vor spori rezervele de umiditate a solului chiar și în stratul de doi metri. La sfârșitul lunii februarie, în majoritatea regiunilor arabile, rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru sub culturile de cereale de toamnă se aflau la niveluri apropiate de capacitatea de câmp. Excepții s-au înregistrat local în Câmpia Dunării – stațiile agrometeorologice: Bazovets, Novachene, Pavlikeni, și în regiunile sud-estice – stațiile agrometeorologice: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik, unde rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru sub grâu erau sub 90% din capacitatea de câmp.

În luna martie, condiții favorabile pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere – pregătirea solului înainte de semănat și semănatul culturilor de primăvară timpurii și medii-timpurii (măzăriche, ovăz, orz de primăvară, mazăre); tratamente preventive pre-inflorire în livezi împotriva unei serii de boli – arsura florilor (mănăstirea timpurie), găurirea frunzelor, bula piersicului, tăbăcirea etc., vor fi disponibile în majoritatea zilelor din prima și în a doua jumătate a celei de-a treia decade.

Precipitațiile frecvente prognozate în a doua și în prima jumătate a celei de-a treia decade a lunii martie vor menține un conținut ridicat de umiditate în straturile superioare ale solului și, din acest motiv, în unele locuri din regiunile sudice, termenele agrotehnice pentru semănatul floarea-soarelui vor fi depășite. Perioada optimă pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei are loc între 15–20 martie, iar în Câmpia Dunării începe la mijlocul celei de-a treia decade a lunii (25.03–5.04).

Sursa: INMH