


Protecția plantelor în rapiță 2021 de la Corteva Agriscience™

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.03.2021 Брой: 3/2021



Pentru un alt an consecutiv, **Corteva Agriscience™** oferă soluții complete pentru agricultură, hibrizi cu un potențial ridicat de producție și produse de protecție a culturilor care oferă agricultorilor liniște în ceea ce privește culturile lor. Iată soluțiile noastre pentru câmpii curate în cultura de rapiță:

Galera™ Super este cel mai larg erbicid post-emergent cu spectru larg împotriva buruienilor dicotiledonate în rapiță, deoarece controlează chiar și buruienile dicotiledonate persistente. Se aplică de la a doua frunză până la nouă sau mai multe noduri dezvoltate, BBCH 12–39, atât primăvara, cât și toamna, atunci când buruienile sunt prezente. Aplicat în doză de 25 ml/da cu un volum de stropire de 10–40 l/da în rapiță, **Galera™ Super** oferă un control excelent al albăstrelui, mușetelului, pălămidăi, volburii, troscotului, roșcovului, steluței, măselariței, pălămidăi, macului de câmp, lipiței, scaietei, știrului, violetei, pălămidăi, macului de câmp, traista ciobanului, floarea-soarelui pășunat și altele.

Belkar™ EC este un nou erbicid pentru tratamentul post-emergent de toamnă al rapiței, cu un nou mod de acțiune – ajută la controlul buruienilor care au dezvoltat deja rezistență la erbicidele pe bază de inhibitori ALS și altele. Aplicat în doză de 50 ml/da de la stadiul de rozetă (prima pereche de frunze adevărate) până la stadiul celei de-a patra perechi de frunze adevărate (BBCH 12–30), **Belkar™** controlează un spectru larg de buruieni, cum ar fi lipița, știrul, mușețelul, albăstrelul, macul de câmp, geraniul, traista ciobanului, precum și buruieni greu de controlat, cum ar fi pălămida, și, de asemenea, buruieni rezistente la erbicidele ALS și buruieni crucifere (muștar sălbatic).

Shadow®, oferit pe piață de **Corteva Agriscience™**, este un erbicid dovedit de-a lungul anilor, cu o calitate constantă, flexibilitate de aplicare, eficacitate și selectivitate ridicate. Are un spectru de activitate extrem de larg – controlează toate buruienile anuale și perene de graminee, voluntarii din culturile de cereale, iarba gășii și iarba Sudan, printre altele, într-un număr mare de culturi dicotiledonate, cum ar fi floarea-soarelui, rapița, cartofii, fasolea, sfecla de zahăr și multe altele. Pentru mai multe informații, vizitați-ne la Corteva.bg sau contactați reprezentantul regional.