

Sistem de combatere a dăunătorilor pentru ceapă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Dăunător – Musca cepei *Delia antiqua*

Vătămarea produsă

Larvele eclozate pătrund în baza frunzelor, rodește o galerie în tulpină și se mută în bulb. Plantele vătămăte rămân în urmă în creștere, se îngălbenește, se culcă, pot fi smulse ușor și în cele din urmă se usucă. Ca urmare a vătămării, țesuturile fermentează și emit un miros neplăcut de ceapă putrezită.

Lupta

Începutul zborului muștelor este așteptat în a doua decadă a lunii aprilie. Plantele infestate trebuie îndepărtate și distruse imediat. Primul tratament trebuie efectuat în perioada zborului în masă, care coincide cu înflorirea vișinului. Pragul economic de dăunare: *5 muște/10 măturări cu plasa entomologică*.

Dăunător – Tripsul tutunului *Thrips tabaci*

Vătămarea produsă

Tripsii sug seva din frunze și pe acestea apar pete alburii. La infestări puternice, petele se contopesc și întreaga frunză devine albă. Pe pete se pot observa puncte mici negre – excrementele dăunătorului.

Lupta

În aprilie, trebuie acordată atenție tripsului tutunului încă de la începutul apariției sale, când se mută de pe resturile vegetale sau buruieni pe ceapă.

Dăunător – Mana *Peronospora destructor*

Vătămarea produsă

Pe frunze apar pete eliptice, clorotice până la verde-deschis, care, în vreme umedă, sunt acoperite cu o creștere violetă de sporulare. Condiții favorabile pentru infecție sunt create la temperaturi de 3–25 °C și prezența picăturilor de apă reținute pe plante.

Lupta

Eradicarea plantelor voluntare și primar infectate. La depistarea primelor pete ale bolii, trebuie efectuate tratamente de vegetație. În perioadele de vreme uscată, tratamentele pot fi efectuate mai rar.

La tratarea culturilor de ceapă, trebuie adăugat un adjuvant!