

Proгноza agrometeorologică pentru luna iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



În prima decadă a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă. La începutul lunii se prognozează precipitații semnificative și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 și 100 cm. În majoritatea ținuturilor țării, rezervele de umiditate a solului pentru culturile de primăvară vor atinge niveluri de până la, iar în Câmpia Dunării – chiar peste 80-85% din capacitatea de câmp. Umiditatea solului va rămâne mai scăzută în unele dintre regiunile estice și sudice, unde precipitațiile din mai au fost mai reduse, în locuri sub 50-60% din normele lunare – G. Delcev, Sliven, St. Zagora, Varna, Carnobat, Burgas, Ahtopol.

La începutul lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai lent, în condiții meteorologice răcoroase pentru sezon. În prima decadă, vor avea loc umplerea boabelor și faza de coacere lăptoasă la grâu.

La sfârșitul decadei, la orz în unele locuri din regiunile sudice, se va observa și coacerea cerosă – Sandanski. Ploile vor limita posibilitățile de efectuare a tratamentelor de protecție a plantelor împotriva manei la viță de vie și culturi legumicole, a tăcii și putregaiului brun la pomii fructiferi și împotriva ploșniței cerealelor de toamnă. În a doua jumătate a perioadei, probabilitatea grindinei și a precipitațiilor locale rămâne, prezentând un risc de deteriorare a culturilor agricole. Riscul de culcare a plantelor la grâu și orz este ridicat.

În a doua decadă, se prognozează o îmbunătățire și normalizare a condițiilor termice. În această decadă, orzul își va finaliza dezvoltarea. La rapiță, va avea loc faza de coacere.

În a treia decadă, dezvoltarea culturilor agricole va decurge la temperaturi apropiate de normele climatice. În această perioadă, la grâu în regiunile de câmp, se va observa coacerea cerosă.

La sfârșitul lunii iunie, o parte din culturile de primăvară vor intra în fazele reproductive ale dezvoltării. La hibridii timpurii de porumb, se va observa înflorirea, iar la floarea-soarelui semănată în termen agrotehnic – începutul fazei de înflorire.

În majoritatea zilelor lunii, umiditatea atmosferică ridicată va menține condiții favorabile pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice: tăciune, găureala și făinarea la pomii fructiferi; manele la culturile legumicole și vița de vie, etc. La vița de vie, perioada inter-fazică de la înflorirea inflorescențelor până la formarea strugurelui de mărimea unui bob de mazăre este critică pentru infecția cu mana și făinarea (oidiu). Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor extrem de importante de protecție a plantelor vor apărea în prima jumătate a celei de-a doua și în a treia decadă a lunii iunie.

De-a lungul întregii luni, probabilitatea grindinei va rămâne crescută. În caz de avariere prin grindină, este recomandabil ca culturile fructifere și legumicole afectate să fie tratate cu fungicide cuprifer la prima ocazie.

Sursa: INMH