

Proгноză agrometeorologică pentru luna septembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.09.2021 Брой: 9/2021



În majoritatea zilelor *primei decade* a lunii septembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă cu precipitații, ceea ce va îmbunătăți rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului – o premisă pentru o pregătire de calitate a terenurilor destinate semănatului cu rapiță de toamnă, o cultură care necesită o agrotehnică precisă. Ploile răspândite de la sfârșitul lunii august au venit prea târziu pentru o parte din culturile de câmp tardive, care, ca urmare a deficitului de umiditate a solului, și-au încheiat dezvoltarea prematur.

La începutul lunii septembrie, etapele finale de dezvoltare ale hibrizilor târzii de porumb care au depășit efectele negative ale secetei estivale accentuate se vor desfășura la temperaturi în jurul și sub normele climatice. În

prima decadă, hibrizii semi-târzii vor intra în fazele de coacere ceară și coacere deplină. La hibrizii târzii, vor avea loc fazele de coacere lapte și trecerea la coacere ceară. Precipitațiile frecvente prevăzute în decadă vor crește riscul de dezvoltare a unor boli fungice – mucegaiul cenușiu pe recolta de struguri în curs de coacere și putregaiul brun târziu pe fructele pomilor fructiferi.

În *a doua decadă*, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Vremea însorită și caldă așteptată în majoritatea zilelor decadei va favoriza sinteza și acumularea mai multor zaharuri în fructele soiurilor de toamnă ale pomilor fructiferi. Până la mijlocul lunii septembrie, hibrizii târzii de porumb își vor încheia dezvoltarea, iar la orez se va observa coacerea ceară și coacerea deplină.

În această perioadă, nu sunt prevăzute precipitații semnificative, iar condițiile vor fi potrivite pentru curățarea suprafețelor de floarea-soarelui și de hibrizii mai timpurii de porumb, precum și pentru efectuarea semănatului rapiței de toamnă.

Condițiile vor fi potrivite pentru executarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului – aratul adânc, pregătirea pre-semănat a terenurilor destinate semănatului cu rapiță de toamnă și culturi cerealiere de toamnă. Perioada este propice pentru pregătirea semăntelor de grâu și orz destinate semănatului de toamnă – dezinfectarea și tratamentul materialului seminal împotriva fitopatogenilor transmiși prin sămânță, mânușii comune și a mânușii afanate, petei septorioze și bolilor cauzate de fusarium.

În *a treia decadă* a lunii septembrie, se vor observa schimbările tranzitorii ale condițiilor agrometeorologice tipice pentru sfârșitul verii și începutul toamnei, cu temperaturi minime mai scăzute. În a doua jumătate a decadei, se preconizează înghețuri la sol în câmpurile mai înalte, ceea ce trebuie luat în considerare la recoltarea culturilor legumicole sensibile la îngheț (roșii, ardei).

Precipitațiile prevăzute la începutul toamnei vor asigura umiditatea necesară pentru desfășurarea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale rapiței de toamnă. La sfârșitul lunii septembrie, la o parte din culturile semănate în termen agrotehnic, se va observa stadiul de încolțire. În stadiul de încolțire, rapița este afectată de puricele căpăstrei verzei (adult) și de musca-gauriciului napului (false omizi), ceea ce necesită monitorizarea culturilor încolțite și, atunci când densitatea dăunătorilor depășește pragul economic de dăunare (PED pentru puricele căpăstrei verzei – 2 gândaci pe m²; PED pentru musca-gauriciului napului – 2–3 false omizi pe m²), tratament oportun.

Sursa: INMH