

# Îngrijirea de toamnă pentru rapiță

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 04.10.2021 Брой: 10/2021



## Măsurile Agrotehnice și de Protecția Plantelor

Respectarea tehnologiei corecte de cultivare, monitorizarea continuă și controlul eficient al dăunătorilor sunt o garanție pentru obținerea unor recolte bune la rapiță.

## Rotația culturilor

Cerealele, leguminoasele și culturile pe rânduri sunt predecesorii cei mai potriviți pentru rapiță, deoarece eliberează terenul devreme și permit un timp suficient pentru pregătirea solului pentru semănat. Floarea-soarelui este un predecesor nepotrivit, întrucât ambele culturi sunt gazde ale unor boli cu importanță economică, precum

Alternaria, Sclerotinia, mucegaiul cenușiu și altele. Este recomandat să semănați rapița pe același loc la fiecare 3-4 ani.

## Lucrarea solului

Este necesar să se asigure un strat de suprafață afânat și moale, fără bulgări și buruieni, fără resturi vegetale din cultura precedentă. Rapița are semințe foarte mici, ceea ce necesită un pat de semănare bine întocmit. Pentru ca semințele să încolțească uniform și pentru a păstra umiditatea solului, este necesară rularea înainte și în timpul semănatului.

## Rezerva bună de umiditate a solului

Rezerva de umiditate a solului potrivită pentru semănat este de aproximativ 70% din capacitatea de câmp. În caz de secetă prelungită, se recomandă așteptarea precipitațiilor pentru a efectua semănatul.

## Tipul de sol potrivit

Pentru rapiță sunt potrivite solurile cu compoziție mecanică medie spre grea, cu reacție neutră - pH 6-7, bogate în humus și calciu, cu bună capacitate de reținere a apei și care nu sunt predispuse la formarea crustei.

## Semănatul

De la sfârșitul lui august până la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie este perioada cea mai optimă pentru semănatul rapiței. Înainte de sosirea înghețurilor de iarnă, plantele ar trebui să fi format o rozetă cu 6-8 frunze și un sistem radicular bine dezvoltat. Adâncimea optimă de semănat este de 2-4 cm pentru a asigura o încolțire uniformă a culturii.

## Fertilizarea

Starea nutrienților din sol și dozele necesare de îngrășămintă pentru cultură se determină cel mai precis după analiza solului pentru fiecare parcelă specifică. Îngrășămintele fosfatice și potasice se aplică cu lucrarea principală a solului, iar îngrășămintele azotate se aplică ca fertilizare de întreținere. Dozele recomandate de îngrășămintă:

- pentru soluri slab înzestrate: Azot 18-20 kg/ha; Fosfor 8-10 kg/ha; Potasiu 10-12 kg/ha.

- pentru soluri bine înzestrate și foarte fertile: Azot 14-16 kg/ha; Fosfor 6-8 kg/ha; Potasiu 9-10 kg/ha.

## Control

### *Combaterea buruienilor*

Recolta de rapiță poate fi redusă sever și poate fi chiar necesară arătura culturii toamna, atunci când stratul este puternic infestat cu buruieni. Pentru a reduce competiția pentru apă, lumină și nutrienți, este importantă distrugerea timpurie a buruienilor.

Trebuie evitat semănatul rapiței pe parcele puternic infestate cu muștar sălbatic și ridiche sălbatică, din cauza riscului de polenizare încrucișată și a controlului dificil al buruienilor din aceeași familie.

Pentru combaterea buruienilor, erbicidele de sol trebuie aplicate înainte de semănat sau după semănat, înainte de încolțirea culturii sau în fazele timpurii de creștere ale rapiței și buruienilor.



Belkar™