


Se așteaptă întârzieri serioase în desfășurarea semănturilor de toamnă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.10.2021 Брой: 10/2021



Precipitațiile răspândite și semnificative de la sfârșitul primei și în prima jumătate a celei de-a doua decadă a lunii octombrie, după seceta prelungită, au crescut brusc rezervele de umiditate a solului din straturile superioare și au asigurat umiditate pentru etapele inițiale de vegetație ale culturilor semănate toamna. În majoritatea țării s-au înregistrat precipitații de până la și peste 50-60 l/m² – cantități care depășesc normele pentru octombrie (Vrața - 79 l/m², Loveci - 62 l/m², Plevna – 50 l/m², Sofia – 68 l/m², Blagoevgrad - 58 l/m², Sandanski - 75 l/m², Kardjali – 77 l/m², Burgas - 75 l/m²). În unele localități din sudul Bulgariei, precipitațiile au atins de două ori normele climatice (Pazardjik - 91 l/m², Plovdiv - 72 l/m², Haskovo - 109 l/m²), iar în aceste

regiuni rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm au crescut la niveluri peste 75 - 80% din capacitatea de câmp.

La mijlocul lunii octombrie se prognozează noi precipitații semnificative din punct de vedere agricol, care vor menține conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului și vor întârzia suplimentar implementarea lucrărilor de pregătire pre-semănat pe suprafețele destinate semănării cu culturi cerealiere de toamnă. Ca urmare a secetei prelungite și a precipitațiilor ulterioare din octombrie, peste normă, se anticipează întârzieri serioase în executarea semănărilor de toamnă. La mijlocul lunii octombrie expiră termenul optim pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei. În perioada următoare, va fi în desfășurare termenul agrotehnic pentru semănatul culturilor cerealiere de toamnă în regiunile sudice ale țării.

În majoritatea zilelor perioadei, dezvoltarea pușinelor culturi de rapiță și cereale de toamnă semănate până acum va avea loc în condiții termice sub normale. În anumite localități din Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Novacene), pentru culturile de toamnă semănate la începutul lunii octombrie, se va observa încolțirea și formarea inițială a frunzelor (1-2 frunze).

La sfârșitul celei de-a doua decadă se așteaptă stabilizarea vremii, o creștere a temperaturilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru finalizarea recoltării strugurilor la soiurile târzii de viță de vin (Mavrud).

Sursa: INMH