

"În livada de pomi fructiferi"

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 01.02.2015 Брой: 2/2015



În zilele calde din februarie și prima jumătate a lunii martie, se efectuează stropiri împotriva fondului de supraviețuire al: **ourilor** de păianjen roșu al mărului, păianjenul brun al mărului, afida verde a mărului, afida roz a mărului, afida ierbii mărului, afida patului de păr, afida tussilagului părului, afida neagră a cireșului, afida făinoasă a prunului, afida verde a piersicului, afida răsucitoare de frunze, afida mare a piersicului, afida mică și mare a prunului, omida mică de iarnă, omida mare de iarnă, plesnitorul frunzelor de trandafir, plesnitorul frunzelor de păducel, plesnitorul cu pete brune; larvelor de scut San Jose, scut galben al părului, scut fals San Jose, scut virgulă. Împotriva acestor dăunători la măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic și prun, se utilizează Para Zomer – 3%. Pentru combaterea simultană a bășicii frunzelor de piersic, mânușii părului și piersicului, găuririi frunzelor și putregaiului brun la sâmburi, cancerului bacterian (gumozității) la cireș, vișin și cais cauzat de *Pseudomonas syringae*, și variolei prunului (șarcei) la prun, se adaugă la Para Zomer

unul dintre fungicidele cu cupru - amestecul Bordeaux-1%, Funguran OH 50WP-0.3%, Champion WP- 0.3%, Kocide 101 WP-0.3%.

La păr, trebuie monitorizată dezvoltarea psilidei obișnuite a părului, în special ieșirea acestora din adăposturile de iarnă și răspândirea adulților supraviețuitori pe mugurii care se umflă, unde încep să sugă seva. La o densitate mare a psilidei (1 individ la 10 ramuri încătușate), este necesară stropirea împotriva indivizilor adulți înainte de depunerea ouălor. Foarte des, tratamentul împotriva acestui dăunător coincide cu tratamentul de iarnă, și atunci se adaugă la Para Zomer unul dintre următoarele insecticide: Vaztak Nov 100 EC – 0.02%, Decis 2.5 EC – 0.03%, Deca EC – 75 ml/da, Sumicidin 5EC – 0.03%. La cireș și vișin în această perioadă, se efectuează un test prin scuturare pentru a determina densitatea gărgăriței cireșului, iar dacă se găsesc 3 adulți pe pom, se face stropire cu Nurelle D/Sanmba/ – 0.08%.

În imagine: Bășica frunzelor de piersic