

Noiembrie este potrivit pentru plantarea pomilor fructiferi.

Автор(и):

Дата: 17.11.2021 Брой: 11/2021



În acest an, condițiile agrometeorologice nefavorabile de la începutul toamnei, seceta prelungită și precipitațiile peste normă din octombrie au împiedicat implementarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. În majoritatea țării, din aceste motive obiective, termenele agrotehnice pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă nu au putut fi respectate.

În noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații în jurul și peste normele climatice.

La începutul lunii noiembrie se așteaptă o creștere substanțială a temperaturilor și o activare a proceselor vegetative la culturile de toamnă semănate. Până la mijlocul primei decade, în majoritatea suprafețelor agricole, condițiile vor permite efectuarea lucrărilor de pregătire premurgătoare semănatului și semănatul culturilor de toamnă. Excepții vor apărea în unele zone din Câmpia Traciei, unde precipitațiile din octombrie au depășit normele lunare de trei până la patru ori (Plovdiv-152l/m², Pazardjik-160l/m², Haskovo-181l/m², Stara Zagora-150l/m², Șirpan-151l/m²), ceea ce a dus la supra-umezirea stratului de sol de 50cm.

La sfârșitul primei săptămâni din noiembrie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Până la mijlocul lunii, acestea vor fi determinate de o vreme instabilă. Precipitațiile așteptate în această perioadă vor întârzia finalizarea semănatului de toamnă. Există o probabilitate mare ca culturile semănate târziu, în noiembrie, să nu reușească să intre în faza de încolțire, faza adecvată pentru iernare, până la sfârșitul vegetației de toamnă.

În perioada următoare, nu se prevăd precipitații semnificative, iar condițiile vor fi potrivite pentru efectuarea activităților agrotehnice sezoniere – aratul adânc și pregătirea solului pentru semănat, precum și finalizarea semănatului culturilor de cereale de toamnă. Condițiile vor permite implementarea măsurilor fitosanitare în plantațiile perene și tratarea pomilor fructiferi afectați împotriva tăcii, ruginii albe, încrețiturii frunzelor etc. Perioada este potrivită pentru plantarea pomilor fructiferi tineri.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, temperaturile medii zilnice prognozate, în jurul și peste normă, vor menține active procesele vegetative la culturile de toamnă. La sfârșitul lunii noiembrie, la grâu, în funcție de datele semănatului, se vor observa diferite faze. Faza de germinare și formare inițială a frunzelor va apărea la culturile semănate în noiembrie. Faza celei de-a treia frunze va predomina la culturile semănate în a treia decadă a lunii octombrie. În puținele culturi de cereale de toamnă semănate la începutul toamnei, în unele locuri din Câmpia Dunării (stațiile agrometeorologice Novacene, Pavlikeni), se va observa faza de încolțire.

În noiembrie, precipitațiile prognozate, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate de toamnă și în straturile mai adânci ale solului. La sfârșitul lunii octombrie, în majoritatea suprafețelor agricole, rezervele de umiditate a solului în straturile de 50cm și 100cm se aflau la niveluri peste 85-90% din capacitatea de câmp.

Pe parcursul lunii, condiții potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi și efectuarea activităților fitosanitare în livezi vor apărea la început și în majoritatea zilelor din a doua jumătate a lunii noiembrie.