

Decembrie – dinamică crescută a condițiilor agrometeorologice

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.12.2021 Брой: 12/2021



Temperaturile peste normal din noiembrie și prezența unor rezerve bune de umiditate a solului au menținut active procesele vegetației la culturile semănate toamna și au creat condiții pentru progresul în dezvoltarea culturilor semănate târziu.

În prima decadă a lunii decembrie, condițiile agrometeorologice vor fi foarte dinamice, cu perioade scurte alternante de temperaturi medii zilnice sub și peste normal, dar rămânând sub minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. La începutul lunii, se va observa o încetinire a creșterii la grâu și orz, iar în a doua jumătate a primei decade, când se prognozează precipitații, inclusiv zăpadă, vegetația în culturi va înceta în majoritatea țării. Excepții vor apărea în locații izolate din regiunile extreme sudice și de-a

lungul litoralului Mării Negre, unde procese vegetative slab exprimate vor continua la culturile semănate toamna, dar acestea nu vor duce la o schimbare a stadiului lor fenologic.

În decada a doua și a treia, temperaturile prognozate, apropiate de normele climatice, vor menține culturile de cereale de toamnă în stare de repaus.

La începutul iernii, stadiul predominant la grâu va fi al treilea frunză. O mică parte a culturilor semănate în termenul agrotehnic în unele zone din Câmpia Dunării și în regiunile nord-estice ale țării va fi în stadiul de încovoietură, care este stadiul adecvat pentru trecerea iernii. Culturile de cereale de toamnă semănate târziu, la mijlocul lunii noiembrie, se află în stadiul de încolțire și stadiul inițial de formare a frunzelor. Motivul obiectiv pentru diferențele substanțiale în starea fenologică a culturilor îl reprezintă semănăturile întârziate din cauza condițiilor nefavorabile de la începutul toamnei (seceta și precipitațiile peste normal din octombrie ulterioare).

În decembrie, temperaturile minime prognozate până la minus 12°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu durată mai lungă, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă neîntărite, aflate în stadiile de încolțire și formare inițială a frunzelor.

Precipitațiile peste normal așteptate în cursul lunii vor crește rezervele de umiditate a solului în stratul de 100 cm, iar în multe locuri din regiunile sudice acestea vor atinge niveluri apropiate de capacitatea de câmp.

Sursa: NIMH