

Ianuarie – condiții potrivite pentru tăierea de iarnă a culturilor pomicole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2022 Брой: 1/2022



La începutul lunii ianuarie 2022, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi ridicate pentru sezon și de valori medii zilnice, în majoritatea suprafețelor arabile ale țării, apropiate de minimul biologic necesar reluării proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă. În regiunile extreme sudice și sud-estice, se vor crea condiții pentru o vegetație slab exprimată la culturile semănate toamna, dar aceasta nu va duce la o modificare a stării fenologice a culturilor. Stadiile de grâu și orz au intrat în iarnă în diferite etape de creștere. Culturile tardive de cereale de toamnă, semănate la sfârșitul toamnei în stațiile agrometeorologice Buzovets, Nikolaevo, Kazanlak, Kyustendil, Chirpan, Haskovo și Sliven, se află în stadiul de încolțire. În culturile semănate în noiembrie din Kneja, Targoviște și Pazardzhik, predomină stadiul celei de-a treia frunze. În stadiul

de încălț, care este stadiul adecvat pentru iernare, se află culturile semănate toamna în termenul agrotehnic în stațiile agrometeorologice Novachene, Pavlikeni, Plovdiv, Lyubimets, Iambol, Provadia, D. Chiflik și Karnobat. La sfârșitul primei săptămâni din ianuarie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Răcirea așteptată va preveni vegetația nedorită a cerealelor de toamnă, care ar duce la înfundarea culturilor și la scăderea rezistenței lor la ger.

În cursul celei de-a doua și a treia decadă, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de normele climatice și vor menține culturile semănate toamna în stare de repaus. Pe parcursul lunii, temperaturile minime prevăzute, între minus 10-15°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, vor prezenta un risc de îngheț pentru culturile semănate târziu. Valorile sub minus 10°C sunt critice pentru culturile de cereale de toamnă în stadiul de încolțire, iar sub minus 13°C și pentru cele în stadiul celei de-a treia frunze.

Precipitațiile așteptate, aproape normale pentru lună, din ianuarie vor spori rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru și de doi metri. La sfârșitul lunii decembrie, rezervele de umiditate a solului pentru grâu în stratul de un metru de sol se aflau, în majoritatea suprafețelor arabile, peste 90% din capacitatea de câmp.

În ianuarie, condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierii de iarnă a culturilor pomicole vor apărea la sfârșitul celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decadă.

Sursa: NIMH