

Februarie – condițiile agrometeorologice vor menține culturile agricole de iarnă în stare de repaus

Автор(и):

Дата: 03.02.2022 Брой: 2/2022



După scurtul episod de frig anticipat la începutul lunii februarie, în majoritatea zilelor primei și începutului celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice, dar sub minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

Temperaturile prognozate în a doua jumătate a lunii februarie, în majoritatea zonelor țării, vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru perioadă și vor menține culturile agricole de iarnă în stare de repaus. Excepții se vor

înregistra local în regiunile sudice și de sud-est, unde în a treia decadă se vor crea condiții pentru o vegetație slab exprimată la grâu și orz, dar acest lucru nu va duce la o schimbare a stadiului fenologic al culturilor.

Pe parcursul lunii, în arealele de câmp, nu se anticipează formarea unei stratului de zăpadă protector și persistent pentru culturile semănate toamna. În condiții fără strat de zăpadă, temperaturile minime prognozate, până la minus 13 – 14°C, dacă persistă pentru o perioadă mai lungă, vor reprezenta din nou un risc de îngheț pentru culturile de cereale de toamnă semănate târziu, aflate în faza de încolțire și 1-3 frunze (stații agrometeorologice: Bazovets, Kneja, Nikolaevo, Kyustendil, Haskovo, Sliven, Chirpan). Aceste valori sunt peste cele critice pentru culturile care iernează în faza de încovoietură.

Precipitațiile așteptate în februarie, în jurul și sub normă, vor spori rezervele de umiditate a solului din stratul de un metru și de doi metri. În luna ianuarie, în majoritatea zonelor țării, rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru, măsurate la culturile de cereale de toamnă, erau peste 90% din capacitatea de câmp. Excepții s-au înregistrat în unele localități din regiunile estice și sudice (stații agrometeorologice: Razgrad, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Haskovo, Chirpan, Sliven), unde nivelurile rezervelor de umiditate a solului erau mai scăzute – sub 80% din capacitatea de câmp.

Pe parcursul lunii, condiții mai favorabile pentru tăieri de întreținere în livezi și vii vor apărea la mijlocul primei, începutul celei de-a doua și în a treia decadă. În a treia decadă, se așteaptă o îmbunătățire a

condițiilor pentru fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășămintе minerale azotate, precum și pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare de semănat pe suprafețele destinate semănării cu culturi de primăvară timpurii (mazăre, mazărice, ovăz, orz de primăvară).

Sursa: INMH