

Proгноza agrometeorologică pentru perioada 18-24 februarie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.02.2022 Брой: 2/2022



Temperaturile peste normal din perioada trecută, cu valori maxime ce au depășit 16-17°C în multe zone ale țării, au întrerupt perioada de repaus a culturilor semănate toamna și au provocat o dezvoltare prematură la unele specii de pomi fructiferi cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) în zone ale Câmpiei Dunării (stația agrometeorologică Pavlikeni) și în regiunile sudice (Petrich, Sandanski).

În prima jumătate a următoarei perioade de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi din nou determinate de temperaturi ridicate pentru sezon, ceea ce va relua și va intensifica procesele vegetației la culturile de cereale de toamnă și la plantațiile perene. La începutul celei de-a treia decadă a lunii februarie, stadiul de creștere al celei de-a treia frunze va predomina la grâu. O pondere mai mică a suprafețelor se află în stadiul de încolțire.

În ultimele zile ale perioadei, se prognozează o scădere substanțială a temperaturilor, dar fără valori minime critice pentru culturile agricole. În zonele de câmp, la sfârșitul perioadei, temperaturile medii zilnice vor fi apropiate de minimul biologic necesar pentru vegetația cerealelor de toamnă.

Ce boli majore sunt combătute prin tratamentele de iarnă în livadă

În cursul perioadei, se va observa umflarea mugurilor la speciile cu sămbure. Intervalul dintre stadiile de umflare a mugurilor și de deschidere a mugurilor este o perioadă în care nu trebuie omisă pulverizarea preventivă a pomilor fructiferi cu fungicide care conțin cupru. Aceste tratamente sunt de o importanță deosebită pentru reducerea infecțiilor de la patogenii care iernează: arsura florilor (putregaiul brun timpuriu), gălbinarea frunzelor de piersic, gaura de glonț (la cireș, cais, prun), etc. Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor în livezi, pentru fertilizarea minerală cu azot a culturilor de toamnă și pentru pregătirea solului în vederea semănatului culturilor de primăvară timpurie vor apărea la începutul perioadei.

Sursa NIMH